Särtryck ur
VÅR FÅGELVÄRLD
Årg. 13 1954 Nr 2

Verksamheten vid Ottenby fågelstation 1953

(Meddelande nr 17 från Ottenby fågelstation)

Av

WOLF JENNING

ELANDERS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG — GÖTEBORG 1954

VÅR FÅGELVÄRLD

ÅRG. 13 1954 NR 2

Verksamheten vid Ottenby fågelstation 1953

(Meddelande nr 17 från Ottenby fågelstation)

Av

WOLF JENNING

Stationens sjunde verksamhetsår blev det hittills mest framgångsrika. Kungl. Maj:t beviljade även 1953 ett anslag ur Jaktvårdsfonden att användas till ersättning åt personalen vid föreningens båda fågelstationer. Detta bidrag mottogs med stor glädje, men det räckte ej till att täcka föreningens utgifter i samband med verksamheten, varför de i tidigare rapporter omtalade ekonomiska svårigheterna tyvärr fortsätter.

Arbetet vid Ottenby pågick under tiden 1 april till 31 oktober och följande personer tjänstgjorde som observatörer eller ringmärkare: HANS BECKMAN, ÅKE BRÄNNSTRÖM, BORIS ENGSTRÖM, ROLF GILLIN, STIG HELLGREN, GÖRAN HÖGSTEDT, WOLF JENNING, JOEL JÄRBING, JÖRGEN KARLSSON, GÖRAN LILJEDAHL, SVEN MATHIASSON, LARS MELANDER, HARRY MYRBERG, SVEN REILAND, JAN STENKLINT och MAGNUS VELANDER. Liksom tidigare medverkade även i år ett större antal frivilliga krafter.

Vinterfaunan

Ett tillfälligt besök som förf. gjorde under tiden 15.—22.2. resulterade i en del intressanta observationer. »Fåken» hade nyss lamslagit trafiken på Öland och överallt tornade sig drivor med snö och is. Fyrträdgården var för en gångs skull fågeltom så när som på en koltrast (♂). Flera havsörnar, de flesta ungfåglar, gästade udden. Vid ett tillfälle sågs ej mindre än sex ex. tillsammans strax öster om stationsbyggnaden. De livnärde sig huvudsakligen på oljeskadade dykänder, som här och var satt uppkrupna på iskanten. Örnarna försökte sig även på friska fåglar men utan större framgång. Gräs-

änderna, den dominerande arten, sökte ofta föda endast några få meter från örnarna och tog till vingarna först när någon örn lyfte. Ett trevligt inslag bildade en flock på omkring 35 salskrakar, till större delen gamla hanar, som låg i en öppen ränna strax nedanför vindskyddet. Där iakttogs även en gråhakedopping. Vid en exkursion upp till lunden observerades berglärkor och snösparvar samt en stenknäck.

Sträcket 1953

Vårsträcket kom i gång ovanligt sent. Förhoppningen att stäpphökarna skulle återvända till sina nya häckplatser grusades tyvärr. Bland mera anmärkningsvärda arter må nämnas följande. En svartbent strandpipare observerades den 6.4. Härfågel visade sig vid flera tillfällen under andra hälften av april. Sannolikt rörde det sig om mera än ett exemplar. Svart rödstjärt uppträdde allt emellanåt fr. o. m. den 4.4. En skrikörn visade sig den 2.5. Ringtrastar (♂♂) sågs den 13., 16. och 18.5., varav ett ex. infångades. Den 21.5. iakttogs fem mosnäppor. Smalnäbbade simsnäppor uppträdde vid flera tillfällen i slutet på maj och sedan på hösten. En turkduva gästade fyrträdgården den 1.6. Sommargylling konstaterades vid ett flertal tillfällen i lunden under juni. Två kärrsångare infångades den 8.6., likaså en rosenfink (♀), ny för Öland, den 10.6. Liten flugsnappare torde även i år ha häckat i lunden. Den 12.8. passerade i sällskap med fem gräsänder en snatterand över stationen. Mindre strandpipare gästade udden vid flera tillfällen i slutet på juli. Den 7.8. observerades en, den 4.9. två glador vid lunden. Under större delen av sommaren uppehöll sig en storskarv vid udden. Den försökte upprepade gånger att övernatta på fyren. En jaktfalk jagade vid udden den 11.10., sannolikt även den 14.10. I slutet av oktober visade sig en skärsnäppa vid flera tillfällen. Den 13.12. tillvaratog fyrmästare E. Andersson en klykstjärtad stormsvala (*Oceanodroma leucorrhoa*), som troligen flugit mot fyren. Ett annat exemplar hittades redan 1948, i början på december, men har först nu blivit tillgängligt för artbestämning. Dessa båda fynd är de första för Öland.

Antalet rastande skärfläckor i Sandvik uppgick i slutet av juli till omkring 170. Arten är tydligen fortfarande på frammarsch, vilket även framgår av den kontinuerliga ökningen av antalet utsträckande fåglar. Flera par häckade under året på ängarna öster om lunden. På tal om häckfågel bör även nämnas att halsbandsflugsnapparen

Fig. 1. »Fyrnatt». Observera den upplysta fasaden som hindrar fåglarna att flyga ihjäl sig. Foto: LENNART LUNDHOLM. (*The light-house in hazy weather. The walls are illuminated to prevent nocturnal migrants from flying to death.*)

konstaterades häckande i lunden i år. En närmare redogörelse för denna händelse är att vänta i denna tidskrift.

På grund av juni månads mestadels stadigt vackra väder var tornsvalornas aktivitet under observationstiden synnerligen låg. Endast 32.000 »utsträckande» kunde konstateras, vilken siffra är den lägsta sedan Ottenbyverksamhetens början. Ett kraftigt södergående sträck av tornsvalor och äkta svalor observerades under ett par dagar redan i slutet av maj. Egendomligt var tornsvalornas beteende kvällen den 30.7. Vid tillfället blåste sydlig vind (ca 5 m/sek.), och sikten var nedsatt av markdis. En kallfront närmade sig från sydväst. Vid 19-tiden uppenbarade sig plötsligt flera hundra tornsvalor och började jaga lågt över Sälön och udden. Det susade i luften av deras vingar. Icke någon av dem intresserade sig för fyren, vilket eljest är brukligt så här dags. En halv timme senare frigjorde sig mindre grupper om ca 50 och försvann snett uppåt i sydlig riktning. De kunde följas ganska länge i kikare. En halvtimme efter solens nedgång lämnade sista gruppen udden på detta sätt.

En anmärkningsvärd tornsvalerörelse ägde rum den 14.8., då drygt 6.000 tornsvalor observerades på väg söderut. Öland hade sedan någon dag tillbaka legat i centrum för ett kraftigt högtrycksområde. Sträcket började redan den 13.8. på eftermiddagen. Med hänsyn till väderlekssituationen torde här vara fråga om verklig flyttning.

Vid månadsskiftet juli/augusti kunde vid ett par tillfällen samtliga i landet bofasta arter av *Laridae* utom fjällabb observeras samtidigt utanför udden, ett enastående tillfälle att jämföra de olika arternas fältkännetecken. Vad beträffar förekomsten av labb fortsatte fjolårets kraftiga nedgång av antalet observerade ex.

Under tiden 8.7.—11.8. kontrollerades 34 kärrsnäppor, som försetts med ring under tidigare år. Av dessa hade 24 märkts vid Ottenby, och sju vid Norges fågelstation Revtangen nära Stavanger samt tre vid fågelstationen på Amager nära Köpenhamn. Om man lägger de tre danska fåglarna till de 24 svenska, vilket torde vara tillåtet med hänsyn till tidigare resultat, får man fram att approximativt 20 % av de i år vid Ottenby passerande gamla kärrsnäpporna tidigare flyttat utefter den norska kusten. Förhållandet fångade/sträckobserverade kärrsnäppor under ovannämnda tidsrymd var 4.060/26.000, vilket torde betyda att antalet redan tidigare märkta kärrsnäppor i år vid Ottenby sannolikt var m i n s t 6 à 7 gånger större än det kontrollerade. Omkring en procent av de kärrsnäppor som sträckte över Öland under denna tid skulle alltså ha burit ring år 1953 i n n a n de nått ner till Ottenby. Av de tidigare Ottenbymärkta 24 var endast 6 ringmärkta som ungfåglar hösten 1952 och 18 st. eller 75 % alltså äldre än ett år. Sträckprovet kan alltså ge en fingervisning om normala ålderssammansättningen hos de förbisträckande massorna.

Under sommaren kunde vid några tillfällen fåglarnas anpassning till regelbundet återkommande ljudeffekter studeras. När mistluren sätter i gång på grund av nedsatt sikt, skrämmes samtliga vid udden rastande vadare på vingarna. Detta upprepas ett par tre gånger när ljudet återkommer efter en kortare paus. Sedan, fr. o. m. femte eller sjätte gången, bryr de sig icke längre om ljudstötarna utan fortsätter med sina göromål trots att denna signalering i hög grad måste betraktas som »sanitär olägenhet» åtminstone för den tjänstgörande observatören.

Under året förekom även flera »laviner», som dock icke var så utpräglade som de under fjolåret observerade.

Invasioner

Mycket intressant var den rikliga förekomsten av invasionsfåglar. Korsnäbbar, sannolikt enbart den mindre arten, iakttogs från slutet av maj i lunden, vilket med hänsyn till biotopen är anmärkningsvärt. De första utsträckande konstaterades under sista veckan i juli. Sträcket pågick sedan något så när jämnt fördelat till observationstidens slut. Sammanlagt observerades 300 lämna udden. Vid flera tillfällen besökte flockarna fyrträdgårdens rönnar, varvid några ex. fångades i ryssjorna (31 märkta mot endast två tidigare).

Den 23.9. infann sig plötsligt ett större antal svartmesar vid udden. Under tiden 23.—26.9. sträckte 290 och märktes 263 ex. Den 24.9. utförde 250 svartmesar sträckförsök samtidigt. Sedermera konstaterades endast sträckförsök och då av ett mindre antal fåglar. Mot sammanlagt 24 tidigare märkta kunde under denna höst 313 svartmesar förses med ringar.

Den 4.10. anlände en flock på 33 nötskrikor. De försökte sträcka, men vände och drog sig upp mot lunden. De försökte igen under de följande dagarna, men lyckades först den 13.10., då 12 lämnade udden. Märkta: 17 mot tidigare en. Beträffande antalet sträckande grönsiskor fortsatte den kontinuerliga ökning som pågått sedan 1950 (då siffran föll avsevärt efter ett tidigare maximum). Även större hackspett uppträdde påfallande talrikt, 15 ex. fångades mellan den 1.9. och 13.10., samtliga som väntat ungfåglar. Domherren, som lyst med sin frånvaro under några år, återfinnes på årets sträcktabell med 190 ex. Slutsumman för bergfink ökades kraftigt jämfört med de båda föregående åren. Ovanligt många snöskator sträckte under dagtimmarna under denna höst; enbart den 21.10. noterades 1.300 ex. Arten är eljest huvudsakligen nattflyttare. Sidensvansar anlände redan den 9.10.; de var dock icke fullt så talrika som under förra året.

Även frånsett invasionsfåglarna uppvisar årets sträcktabell för vissa arter betydande avvikelser jämfört med tidigare år. Ovanligt höga siffror — som icke nåtts tidigare — erhålles för en del vadare t. ex. myrspov (1.900, varav 541 den 19.8.), kärrsnäppa (29.500) och brushane (1.140). För några arter noterades däremot ovanligt svagt sträck. Visserligen var hösten 1953 utomordentligt mild och därför har frekvenskurvan för vissa arter säkerligen flyttats fram avsevärt, så att observationstiden relativt sett upphört tidigare än vanligt. En del minskningar kan dock icke förklaras på detta sätt. Så erhålles

för sädesärla och hussvala slutsiffror, som är de lägsta som någonsin erhållits sedan verksamhetens början. Rödstrupig piplärka förekommer detta år varken i sträck- eller märkningstabellen. Den har dock observerats vid några tillfällen i september.

Här bör också sägas några ord beträffande de i sträcktabellen rikligt förekommande »obestämda andfåglarna». Vissa dagar förekommer s. k. »horisontsträck». Sjöfåglarna passerar udden på vägen mot sydväst vid horisontlinjen eller rättare sagt bakom, då de ju befinner sig en bit upp i luften. Vid mycket goda siktförhållanden har med hjälp av stationens tubkikare (40×) kunnat konstateras att de passerande flockarna huvudsakligen utgöres av ejder, sjöorre och svärta. Oftast är dock denna artbestämning omöjlig. Givetvis innehåller denna siffra även ett mindre antal änder som passerat udden på nära håll men på grund av någon omständighet icke kunnat bestämmas till arten.

Av någon anledning har fiskgjusen glömts bort i förra årsrapporten. Den observerades sträckande både 1951 och 1952 med 27 resp. 38 exemplar.

Tabell 1. Totalsumma vid Ottenby dagsträckande fåglar 1 juni—31 oktober 1953

Endast sådana fåglar har här medtagits, vilka av observatören iakttagits sträckande ut över havet eller i vissa fall insträckande därifrån, kallat —sträck (minussträck eller insträck). Siffrorna är minimisiffror och omfattar endast dagsträck. (*Total number of diurnal migrants seen flying south over the sea at Ottenby Bird Station between June 1st and Oct. 31st, 1953. Birds arriving over the sea from the south on »reversed migration» are listed with a minus sign before the figure.*)

	ex.		ex.
Kråka (*Corvus corone cornix*)	270	Gulsparv (*Emberiza citrinella*) ...	1.400
Råka (*C. frugilegus*)	13	Sävsparv (*E. schoeniclus*)	220
Kaja (*C. monedula*)	120	Lappsparv (*Calcarius lapponicus*)	3
Nötskrika (*Garrulus glandarius*) ..	12	Snösparv (*Plectrophenax nivalis*) .	1
Stare (*Sturnus vulgaris*)	47.900	Trädlärka (*Lullula arborea*)	160
Grönfink (*Chloris chloris*)	4.900	Sånglärka (*Alauda arvensis*)	1.210
Steglits (*Carduelis carduelis*)	270	Berglärka (*Eremophila alpestris*) .	39
Grönsiska (*C. spinus*)	6.500	Trädpiplärka (*Anthus trivialis*) .	2.800
Gråsiska (*C. flammea*)	230	Ängspiplärka (*A. pratensis*)	760
Vinterhämpling (*C. flavirostris*) ..	920	Skärpiplärka (*A. spinoletta*)	280
Hämpling (*C. cannabina*)	9.000	Obest. piplärkor (*Anthus spp.*) ...	50
Domherre (*Pyrrhula pyrrhula*) ...	190	Gulärla (*Motacilla flava*)	720
Korsnäbb (*Loxia spp.*)	300	Sädesärla (*M. alba*)	7.400
Bofink (*Fringilla coelebs*)	5.100	Obest. ärlor (*Motacilla spp.*)	10
Bergfink (*F. montifringilla*)	12.000	Talgoxe (*Parus major*)	3

	ex.
Blåmes (*P. caeruleus*)	22
Svartmes (*P. ater*)	290
Sidensvans (*Bombycilla garrulus*)	810
Snöskata (*Turdus pilaris*)	1.700
Taltrast (*T. ericetorum*)	5
Rödvingetrast (*T. musicus*)	16
Järnsparv (*Prunella modularis*)	3
Ladusvala (*Hirunda rustica*)	2.100
Hussvala (*Delichon urbica*)	1.300
Backsvala (*Riparia riparia*)	5.400
Obest. svalor (*Hirundo, Delichon, Riparia*)	60
Obest. småfåglar (*Passerines spp.*)	870
Tornsvala (*Apus apus*)	31.900, — 40
Större hackspett (*Dendrocopos major*)	4
Pilgrimsfalk (*Falco peregrinus*)	2
Lärkfalk (*F. subbuteo*)	10
Stenfalk (*F. columbarius*)	37, — 1
Tornfalk (*F. tinnunculus*)	80
Obest. falkar (*Falco spp.*)	4
Fjällvråk (*Buteo lagopus*)	150
Ormvråk (*B. buteo*)	26
Brun kärrhök (*Circus aeruginosus*)	18
Ängshök (*C. pygargus*)	6
Blå kärrhök (*C. cyaneus*)	5
Obest. kärrhökar (*Circus spp.*)	5, — 1
Sparvhök (*Accipiter nisus*)	400
Glada (*Milvus milvus*)	2
Bivråk (*Pernis apivorus*)	37
Obest. vråkar (*Buteo/Pernis*)	4
Fiskgjuse (*Pandion haliaetus*)	34
Häger (*Ardea cinerea*)	12
Sångsvan (*Cygnus cygnus*)	155
Knölsvan (*C. olor*)	35
Grågås (*Anser anser*)	830
Vitkindad gås (*Branta leucopsis*)	270
Prutgås (*B. bernicla*)	210
Obest. gäss (*Anser/Branta*)	700
Gravand (*Tadorna tadorna*)	3.530
Gräsand (*Anas platyrhynchos*)	1.230
Kricka (*A. crecca*)	800
Årta (*A. querquedula*)	1
Bläsand (*A. penelope*)	12.700
Stjärtand (*A. acuta*)	2.920
Skedand (*A. clypeata*)	420
Brunand (*Aythya ferina*)	6
Vigg (*A. fuligula*)	22
Bergand (*A. marila*)	26
Knipa (*Bucephala clangula*)	23
Alfågel (*Clangula hyemalis*)	6
Ejder (*Somateria mollissima*)	7.420
Sjöorre (*Melanitta nigra*)	2.470
Svärta (*M. fusca*)	480
Storskrake (*Mergus merganser*)	42
Småskrake (*M. serrator*)	250
Obest. skrakar (*Mergus spp.*)	130

	ex.
Obest. andfåglar (*Anseriformes spp.*)	18.000
Storlom (*Colymbus arcticus*)	18
Smålom (*C. stellatus*)	1
Obest. lommar (*Colymbus spp.*)	78
Ringduva (*Columba palumbus*)	810
Skogsduva (*C. oenas*)	2.460
Myrspov (*Limosa lapponica*)	1.900
Rödspov (*L. limosa*)	30
Storspov (*Numenius arquata*)	2.640
Småspov (*N. phaeopus*)	440
Obest. spovar (*Numenius spp.*)	130
Enkelbeckasin (*Capella gallinago*)	113
Roskarl (*Arenaria interpres*)	290
Kustsnäppa (*Calidris canutus*)	1.110
Kärrsnäppa (*C. alpina*)	29.500
Spovsnäppa (*C. ferruginea*)	280
Småsnäppa (*C. minuta*)	16
Mosnäppa (*C. temminkii*)	31
Sandlöpare (*C. alba*)	18
Brushane (*Philomachus pugnax*)	1.140
Myrsnäppa (*Limicola falcinellus*)	3
Drillsnäppa (*Tringa hypoleucos*)	90
Grönbena (*T. glareola*)	900
Skogssnäppa (*T. ochropus*)	27
Rödbena (*T. totanus*)	4.090
Svartsnäppa (*T. erythropus*)	160
Gluttsnäppa (*T. nebularia*)	350
Större strandpipare (*Charadrius hiaticula*)	1.590
Obest. storvadare (*Philomachus/Tringa*)	10
Obest. småvadare (*Small waders spp.*)	770
Ljungpipare (*Pluvialis apricaria*)	150
Kustpipare (*Pl. squatarola*)	500
Tofsvipa (*Vanellus vanellus*)	1.300
Skärfläcka (*Recurvirostra avosetta*)	170
Strandskata (*Haematopus ostralegus*)	6.350
Trana (*Grus grus*)	880
Svarttärna (*Chlidonias niger*)	52
Skräntärna (*Hydroprogne tschegrava*)	32
Kentsk tärna (*Sterna sandvicensis*)	86
Fisk- och silvertärna (*S. hirundo/paradisaea*)	4.000
Småtärna (*S. albifrons*)	390
Dvärgmås (*Larus minutus*)	29
Skrattmås (*L. ridibundus*)	6.070
Fiskmås (*L. canus*)	430
Gråtrut (*L. argentatus*)	1.150
Silltrut (*L. fuscus*)	620
Havstrut (*L. marinus*)	29
Obest. måsar (*Larus spp.*)	260
Labb (*Stercorarius parasiticus*)	2
Tordmule (*Alca torda*)	4

Märkningsarbetet 1953

De i förra årsrapporten omtalade ringbekymren fortsatte tyvärr då den av föreningen anlitade fabriken icke kunde frambringa erforderligt antal ringar. Genom snabb hjälp från dr R. KUHK (Vogelwarte Radolfzell) kunde en katastrof mot slutet av maj avvärjas. Den 1 augusti var det emellertid slut igen. För att icke behöva äventyra märkningen av ur fångstsynpunkt mera sällsynta arter, beslöts att fr. o. m. denna dag släppa kärrsnäpporna omärkta tills ringsituationen ljusnade igen. Trots att Riksmuseet och återigen Radolfzell försåg stationen med ytterligare några tusen ringar fick åtskilliga fåglar släppas utan ring.

Medan man vid Ottenby lyckats bra med fångst av vid udden rastande småfåglar och vadare, står märkningsresultaten för andfåglar i ingen som helst proportion till förekomsten av dylika. Dessa omärkta änder har länge varit våra sorgebarn, i synnerhet som man på jägarehåll är mycket angelägen om att sådan märkning bedrives i större omfattning än hittills. Efter vederbörligt tillstånd utfördes under våren vissa provgrävningar i Sandvik. Avsikten var att där placera några automatiska andfällor. Ganska snart kom man emellertid underfund med att markens beskaffenhet gjorde företaget större än man från början hade räknat med, och att det väsentligt översteg föreningens förmåga. Under tiden hade J. MCNALLY och D. D. FALCONER publicerat en metod i »The Emu», med vilken de i närheten av Melbourne på knappt 2 månader fångat över 5.000 änder för ringmärkning. Stationskommittén beslöt då att tillsvidare avstå från grävningen och att försöka med denna metod. Fem fällor av den typ som med så stor framgång använts i Australien placerades i början av juli på sandrevlarna utanför Sandvik, men dessvärre fångades icke en enda fullvuxen and i dem, trots att det fanns rikligt med änder runt omkring. Änderna, som skulle betas in, hade tydligen gott om föda på annat håll.

För att övergå till årets resultat märktes under 1953 13.988 fåglar, så att totalsumman nu överstiger 77.000, fördelade på 157 arter. 1.966 kärrsnäppor, 283 kungsfåglar, 34 rödstjärtar och 8 lövsångare släpptes utan ring på grund av ringbrist. Fångstsiffran uppgick således till 16.279, några hundra i boet märkta (företrädesvis hussvalor) inbegripna. Över hälften utgjordes av vadare, vilket tydligt visar att deras numerär nere vid udden var större än någonsin tidigare. Detta berodde icke enbart på att antalet flyttande vadare var

Fig. 2. Småfågelryssjan »Bergman». Foto: LENNART LUNDHOLM. (*Trap for passerine birds at Ottenby.*)

större än vanligt utan även på optimala näringsbetingelser inom fångstområdet. En tångrevel av just den rätta förruttnelsegraden sträckte sig från udden över till Sälöns sydspets med en lagun innanför. *Eristalis*-larver förekom i aldrig sinande mängder. Då larverna uppträdde på skiftande djup kunde fåglar med olika näbblängd söka föda intill varandra, varför ovanligt många arter trängdes på en relativt liten yta. Icke mindre än 71 myrspovar märktes mot sammanlagt 25 tidigare. Totalsumman för brushane 447 ex. (t. o. m. 1952) ökades med 100 %. Fjolårets förnämliga resultat för småsnäppa förbättrades avsevärt: 128 märktes, av vilka de flesta som vanligt utgjordes av ungfåglar. När de mindre ringarna började tryta, placerades några fällor på djupare vatten, vilket gav till resultat att 20 svartsnäppor infångades mot en enda tidigare. Märkligt var även att ett större antal strandskator, både gamla och yngre, kunde fångas i vadarfällorna, vilket eljest endast skett undantagsvis.

Bland icke-vadare må särskilt framhävas årssumman för rödhake, 2.055 märkta exemplar. Därmed överträffades t. o. m. fjolårets

notering. Större delen av dessa fångades under höststräcket, medan t. ex. rödstjärt och flera sångare av märkningsresultatet att döma uppträdde mera talrikt på våren än på hösten. Bland mera sällan fångade arter, som icke behandlats tidigare i denna rapport, bör särskilt nämnas gräshoppsångare (3), pärluggla (1) och hornuggla (15 mot tidigare sammanlagt 12).

Tabell 2. Vid Ottenby märkta fåglar

(*Birds ringed at Ottenby*)

Art (*Species*)	Antal märkta 1937—1952 (*Number ringed 1937—1952*)	Märkta 1953 (*Ringed 1953*)	Totalsumma (*Total sum*)	Återfynd (*Recoveries*)
Kråka (*Corvus corone*)	1	—	1	—
Kaja (*C. monedula*)	1	—	1	1
Skata (*Pica pica*)	1	—	1	—
Nötkråka (*Nucifraga caryocatactes*)	2	—	2	—
Nötskrika (*Garrulus glandarius*)	1	17	18	—
Stare (*Sturnus vulgaris*)	2.594	365	2.959	41
Stenknäck (*Coccothraustes coccothraustes*)	1	—	1	—
Grönfink (*Chloris chloris*)	191	40	231	—
Steglits (*Carduelis carduelis*)	18	1	19	—
Grönsiska (*C. spinus*)	636	142	778	6
Gråsiska (*C. flammea*)	39	8	47	—
Vinterhämpling (*C. flavirostris*)	10	3	13	—
Hämpling (*C. cannabina*)	205	28	233	6
Domherre (*Pyrrhula pyrrhula*)	225	24	249	2
Rosenfink (*Carpodacus erythrinus*)	—	1	1	—
Mindre korsnäbb (*Loxia curvirostra*)	2	31	33	—
Bofink (*Fringilla coelebs*)	462	153	615	2
Bergfink (*F. montifringilla*)	115	55	170	—
Gulsparv (*Emberiza citrinella*)	962	126	1.088	6
Ortolansparv (*E. hortulana*)	21	13	34	—
Videsparv (*E. rustica*)	1	—	1	—
Sävsparv (*E. schoeniclus*)	127	16	143	1
Lappsparv (*Calcarius lapponicus*)	9	—	9	—
Snösparv (*Plectrophenax nivalis*)	1	—	1	—
Gråsparv (*Passer domesticus*)	92	1	93	—
Pilfink (*P. montanus*)	19	3	22	—
Trädlärka (*Lullula arborea*)	1	—	1	—
Sånglärka (*Alauda arvensis*)	76	9	85	4
Berglärka (*Eremophila alpestris*)	2	—	2	—

Tabell 2 forts.

Art (*Species*)	Antal märkta 1937—1952 (*Number ringed 1937—1952*)	Märkta 1953 (*Ringed 1953*)	Total-summa (*Total sum*)	Återfynd (*Recoveries*)
Trädpiplärka (*Anthus trivialis*)	84	23	107	—
Ängspiplärka (*A. pratensis*)	664	16	680	5
Rödstrupig piplärka (*A. cervinus*)	173	—	173	2
Skärpiplärka (*A. spinoletta*)	1.136	25	1.161	8
Gulärla (*Motacilla flava*)	928	48	976	5
Sädesärla (*M. alba*)	4.478	496	4.974	24
Trädkrypare (*Certhia familiaris*)	92	18	110	—
Talgoxe (*Parus major*)	311	15	326	4
Blåmes (*P. caeruleus*)	396	28	424	1
Svartmes (*P. ater*)	24	313	337	—
Entita (*P. palustris*)	1	—	1	—
Talltita (*P. atricapillus*)	1	—	1	—
Stjärtmes (*Aegithalus caudatus*)	59	—	59	—
Varfågel (*Lanius excubitor*)	35	9	44	1
Törnskata (*L. collurio*)	941	111	1.052	2
Sidensvans (*Bombycilla garrulus*)	13	—	13	—
Grå flugsnappare (*Muscicapa striata*)	657	91	748	1
Svartvit flugsnappare (*M. hypoleuca*)	948	130	1.078	5
Halsbandsflugsnappare (*M. albicollis*)	11	—	11	—
Liten flugsnappare (*M. parva*)	27	5	32	1
Kungsfågel (*Regulus regulus*)	1.026	13	1.039	—
Gransångare (*Phylloscopus collybita*)	183	54	237	—
Lövsångare (*Ph. trochilus*)	3.508	821	4.329	4
Grönsångare (*Ph. sibilatrix*)	371	57	428	—
Gräshoppsångare (*Locustella naevia*)	5	3	8	—
Trastsångare (*Acrocephalus arundinaceus*)	3	—	3	—
Rörsångare (*A. scirpaceus*)	47	9	56	—
Kärrsångare (*A. palustris*)	1	—	1	—
Sävsångare (*A. schoenobaenus*)	129	13	142	—
Härmsångare (*Hippolais icterina*)	276	46	322	2
Hökfärgad sångare (*Sylvia nisoria*)	36	1	37	—
Trädgårdssångare (*S. borin*)	590	105	695	3
Svarthätta (*S. atricapilla*)	312	51	363	2
Törnsångare (*S. communis*)	1.124	203	1.327	6
Ärtsångare (*S. curruca*)	1.854	208	2.062	4
Snöskata (*Turdus pilaris*)	8	8	16	1
Dubbeltrast (*T. viscivorus*)	7	1	8	—
Taltrast (*T. ericetorum*)	722	175	897	12
Rödvingetrast (*T. musicus*)	57	23	80	3

Tabell 2 forts.

Art (*Species*)	Antal märkta 1937—1952 (*Number ringed 1937—1952*)	Märkta 1953 (*Ringed 1953*)	Totalsumma (*Total sum*)	Återfynd (*Recoveries*)
Ringtrast (*T. torquatus*)	1	1	2	—
Koltrast (*T. merula*)	69	15	84	3
Stenskvätta (*Oenanthe oenanthe*)	299	10	309	3
Buskskvätta (*Saxicola rubetra*)	68	15	83	1
Rödstjärt (*Phoenicurus phoenicurus*)	2.729	505	3.234	9
Svart rödstjärt (*Ph. ochruros*)	22	5	27	—
Näktergal (*Luscinia luscinia*)	63	12	75	1
Blåhake (*L. svecica*)	34	1	35	—
Rödhake (*Erithacus rubecula*)	7.776	2.055	9.831	37
Järnsparv (*Prunella modularis*)	36	15	51	—
Gärdsmyg (*Troglodytes troglodytes*)	252	71	323	—
Ladusvala (*Hirundo rustica*)	76	1	77	—
Hussvala (*Delichon urbica*)	3.599	459	4.058	275
Backsvala (*Riparia riparia*)	1	—	1	—
Tornsvala (*Apus apus*)	768	9	777	12
Nattskärra (*Caprimulgus europaeus*)	33	6	39	1
Härfågel (*Upupa epops*)	1	—	1	—
Kungsfiskare (*Alcedo atthis*)	1	—	1	—
Gröngöling (*Picus viridis*)	14	4	18	—
Större hackspett (*Dendrocopos major*)	53	15	68	—
Mindre hackspett (*D. minor*)	2	—	2	—
Göktyta (*Jynx torquilla*)	54	18	72	—
Gök (*Cuculus canorus*)	17	2	19	—
Pärluggla (*Aegolius funereus*)	3	1	4	—
Hornuggla (*Asio otus*)	12	15	27	2
Kattuggla (*Strix aluco*)	9	—	9	—
Lärkfalk (*Falco subbuteo*)	3	—	3	—
Stenfalk (*F. columbarius*)	6	2	8	—
Tornfalk (*F. tinnunculus*)	13	1	14	—
Fjällvråk (*Buteo lagopus*)	3	—	3	—
Duvhök (*Accipiter gentilis*)	1	—	1	—
Sparvhök (*A. nisus*)	137	39	176	20
Gravand (*Tadorna tadorna*)	136	44	180	4
Gräsand (*Anas plathyrhyncos*)	155	18	173	8
Kricka (*A. crecca*)	23	11	34	7
Årta (*A. querquedula*)	6	—	6	1
Stjärtand (*A. acuta*)	51	6	57	7
Skedand (*A. clypeata*)	41	—	41	1
Bergand (*Aythya marila*)	28	—	28	—
Ejder (*Somateria mollissima*)	297	28	325	29

Tabell 2 forts.

Art (*Species*)	Antal märkta 1937—1952 (*Number ringed 1937—1952*)	Märkta 1953 (*Ringed 1953*)	Totalsumma (*Total sum*)	Återfynd (*Recoveries*)
Svärta (*Melanitta fusca*)	96	—	96	6
Storlom (*Colymbus arcticus*)	—	1	1	—
Ringduva (*Columba palumbus*)	10	—	10	—
Skogsduva (*C. oenas*)	1	1	2	—
Myrspov (*Limosa lapponica*)	25	71	96	2
Storspov (*Numenius arquata*)	18	3	21	1
Småspov (*N. phaeopus*)	1	—	1	—
Morkulla (*Scolopax rusticola*)	1	—	1	—
Enkelbeckasin (*Capella gallinago*)	21	6	27	3
Dvärgbeckasin (*Lymnocryptes minimus*)	5	1	6	—
Smalnäbbad simsnäppa (*Phalaropus lobatus*)	1	1	2	—
Roskarl (*Arenaria interpres*)	215	129	344	5
Kustsnäppa (*Calidris canutus*)	294	248	542	12
Kärrsnäppa (*C. alpina*)	11.723	3.508	15.231	206
Spovsnäppa (*C. ferruginea*)	597	329	926	10
Småsnäppa (*C. minuta*)	242	128	370	3
Mosnäppa (*C. temminckii*)	203	6	209	7
Skärsnäppa (*C. maritima*)	1	—	1	—
Sandlöpare (*C. alba*)	6	3	9	—
Brushane (*Philomachus pugnax*)	447	446	893	16
Myrsnäppa (*Limicola falcinellus*)	86	13	99	1
Tereksnäppa (*Xenus cinereus*)	1	—	1	—
Drillsnäppa (*Tringa hypoleucos*)	502	57	559	10
Grönbena (*T. glareola*)	1.885	580	2.465	47
Skogssnäppa (*T. ochropus*)	12	3	15	—
Rödbena (*T. totanus*)	768	541	1.309	37
Svartsnäppa (*T. erythropus*)	1	20	21	—
Gluttsnäppa (*T. nebularia*)	1	—	1	—
Större strandpipare (*Charadrius hiaticula*)	730	198	928	18
Mindre strandpipare (*Ch. dubius*)	5	1	6	—
Ljungpipare (*Pluvialis apricaria*)	1	—	1	—
Kustpipare (*P. squatarola*)	3	1	4	—
Tofsvipa (*Vanellus vanellus*)	178	40	218	6
Skärfläcka (*Recurvirostra avosetta*)	7	6	13	1
Strandskata (*Haematopus ostralegus*)	156	68	224	2
Trana (*Grus grus*)	—	1	1	—
Fisktärna (*Sterna hirundo*)	51	—	51	—

Tabell 2 forts.

Art (*Species*)	Antal märkta 1937—1952 (*Number ringed 1937—1952*)	Märkta 1953 (*Ringed 1953*)	Totalsumma (*Total sum*)	Återfynd (*Recoveries*)
Silvertärna (*S. paradisaea*)	89	8	97	4
Skrattmås (*Larus ridibundus*)	339	9	348	16
Fiskmås (*L. canus*)	535	11	546	8
Gråtrut (*L. argentatus*)	3	—	3	—
Silltrut (*L. fuscus*)	1	—	1	—
Havstrut (*L. marinus*)	9	—	9	—
Sillgrissla (*Uria aalge*)	1	—	1	—
Kornknarr (*Crex crex*)	1	—	1	—
Småfläckig sumphöna (*Porzana porzana*)	3	—	3	—
Vattenrall (*Rallus aquaticus*)	12	2	14	—
Rörhöna (*Gallinula chloropus*)	2	—	2	—
Rapphöna (*Perdix perdix*)	118	9	127	15
Summa 157 arter	63.352	13.988	77.340	1.022

Återfynd

Fram till den 1.2.54 inrapporterades 184 nya återfynd, varmed totalsumman överstiger 1.000. Hur många av de vid Ottenby märkta fåglarna får man alltså »höra av igen» i form av återfynd? Det kan vi nu ange tämligen noga åtminstone för de arter, som märkts i fler än 1.000 exemplar. Om man bortser från hussvalan (*Delichon urbica*), där kontroller på häckplatsen drivit upp återfynden till 6,8 %, är siffrorna följande.

Rödbena (*Tringa totanus*) ..... 2,7 %
Grönbena (*T. glareola*) ..... 1,9 %
Stare (*Sturnus vulgaris*) ..... 1,4 %
Kärrsnäppa (*Calidris alpina*) .... 1,3 %
Skärpiplärka (*Anthus spinoletta*) . 0,7 %
Gulsparv (*Emberiza citrinella*) ... 0,6 %
Sädesärla (*Motacilla alba*) ..... 0,5 %
Svartvit flugsnappare (*Muscicapa hypoleuca*) ..... 0,5 %
Törnsångare (*Sylvia communis*) .. 0,5 %
Rödhake (*Erithacus rubecula*) ... 0,4 %
Rödstjärt (*Ph. phoenicurus*) ..... 0,3 %
Ärtsångare (*Sylvia curruca*) ..... 0,2 %
Törnskata (*Lanius collurio*) ..... 0,2 %
Lövsångare (*Phylloscopus trochilus*) 0,1 %
Kungsfågel (*R. regulus*) ..... 0,0 %

Det är uppenbart att återfynden ökar med fåglarnas storlek. För vissa änder och rovfåglar uppgår de till mellan 10 och 20 %.

Av årets återfynd torde de båda gulärlefynden vara de mest värdefulla. Bägge fåglarna får anses ha omkommit i vinterkvarteret.



Fig. 3. En av de 71 myrspovar som märktes under 1953. Foto: Sven Gillsäter. (*In 1953, 71 bar-tailed godwits,* Limosa lapponica, *were ringed at Ottenby.*)

Rapportören av Nigeriafyndet skriver bl. a.: »The bird was yellow breasted with brown wing and tail feathers and I imagine was a 'Yellow wagtail'. A fairly large number of these birds can be seen at this time of the year here in the Ikeja area together with others of the same type, appearance and size but which have black and white feathers.»

Även i år utfördes ett större antal kontroller i hussvalekolonien på Ottenby gård. Där fångades även en hussvala som icke märkts i denna koloni eller i närheten härav utan som ung i Långviksmon, Västernorrlands län (1951), tydligen ett fall av hemortsbyte. Att döma av vad som hittills framkommit genom märkningen tycks hussvalan nå sin maximala ålder vid 5 år. Medellivslängden är givetvis avsevärt kortare. Vidare inkom två återfynd av hornuggla (stationens första) samt ytterligare ett av törnskata (grekiska öarna) och av småsnäppa, denna gång från Italien. Även av flera andra vadare gjordes värdefulla återfynd. Bl. a. har av de 52 under året inrapporterade kärrsnäppefynden fem fåglar märkts så tidigt som 1948. Detsamma gäller för en kustsnäppa. Bland långväga resenärer kan nämnas en hämpling som dödades i närheten av Barcelona, en

taltrast från nordafrikanska kusten samt en kricka som sköts vid Venedig och en annan vid den för sitt fågelskytte ökända lagunen Albufera söder om Valencia. Beträffande ejdern SO 138 meddelade rapportören att sammanlagt ca 15 ejdrar hittades döda eller döende, vilka utom den märkta samtliga utgjordes av ♂♂. Några av dem var nedoljade. För första gången inrapporterades en Ottenby-rödbena från Italien, vilket med hänsyn till tidigare resultat är anmärkningsvärt (jfr återfyndskartan på sid. 73). Slutligen kontrollerades fyra silvertärnor på häckplatsen nära fågelstationen.

Nya återfynd

(*New recoveries*)

h: med visshet häckande eller kläckt vid Ottenby. (*Breeding or hatched at Ottenby.*)
g: genomflyttare, härkomst okänd. (*Passage migrant.*)
Ringnummer i *kursiv* stil anger att ringen insänts tillsammans med rapporten.
(*Ring numbers in italics means that the ring has been returned together with the information on the recovery*).

Stare (*Sturnus vulgaris*)

YO	3361	24.6.50.	juv.	g.	— funnen död, Rye, Sussex, England, 5.4.53.
YO	*5391*	26.5.51.	juv.	h.	— skjuten, nära Fakenham, Norfolk, England, ca 28.1.53.
YO	*5556*	12.6.51.	juv.	g.	— funnen död, nära Mörbylånga, Öland, (ca. 40 km N). ca 1.8.53.
YO	5708	30.6.51.	juv.	g.	— funnen död (rester), Goxhill, Linconshire, England, 5.53.
YO	*5969*	17.7.51.	juv.	g.	— funnen död, Resmo, Öland (ca 40 km N), 13.8.53.
YO	*6232*	28.7.51.	juv.	g.	— funnen död, Färjestaden, Öland (50 km N), 27.3.53.
	501194	29.5.53.	juv.	h.	— fångad, Beernem, Västflandern, Belgien, 11.11.53.
	501584	6.7.53.	juv.	g.	— fångad, Breedene, Västflandern, Belgien, 10.53.
	501980	16.7.53.	juv.	g.	— fångad, Breedene, Västflandern, Belgien, 10.53.

Grönsiska (*Carduelis spinus*)

ZAS	*1613*	23.9.52.		g.	— skjuten, Voltaggio (Alessandria), Piemonte, Italien 2.12.53.

Hämpling (*Carduelis cannabina*)

ZOE	*3725*	18.4.52.	ad. ♀	h?	— kontrollerad, Ottenby, 13.5.53.
ZAE	3803	7.6.52.	ad. ♀	h?	— kontrollerad, Ottenby, 21.6.53.
ZAE	*4219*	9.7.52.	juv.	h?	— skjuten, Canet de Mar, Barcelona, Spanien, ca 25.10.52.

Sånglärka (*Alauda arvensis*)

ZAH	6839	31.7.52.	juv.	h?	— kontrollerad, Ottenby, 10.7.53.
ZAS	1436	16.9.52.		h?	— kontrollerad, Ottenby, 7.7.53.

Ängspiplärka (*Anthus pratensis*)

ZAS	*1518*	21.9.52.	g.	— funnen skadad, Brattfors, Västerbottens län (ca 960 km NNE) enl. medd. dat. d. 10.10.53.

Gulärla (*Motacilla flava*)

	100121	10.8.52.	g.	— dödad, nära Sunyani, Ashanti, Guldkusten, Västafrika, 14.11.52.
(D)	*951974*	18.8.52.	g.	— skjuten, 18 km N Lagos, Nigeria, Västafrika, 17.12.52.

Sädesärla (*Motacilla alba*)

ZOD	*9572*	28.8.51. juv.	g.	— funnen döende, nära Ankarsrum, Kalmar län (165 km N), 30.4.53.

Talgoxe (*Parus major*)

(R) S	14815	20.10.53. juv.	g.	— funnen död, Gårdby (47 km NNE), enl. medd. dat. 9.1.54.

Törnskata (*Lanius collurio*)

ZAS	770	10.9.52. juv.	g.	— fångad, ön Kimolos (Kykladerna), Grekland, 8.53.

Taltrast (*Turdus ericetorum*)

YO	6754	6.10.51.	g.	— skjuten?, nära Philippeville, Constatine, Algeriet, Nordafrika 3.53.

Koltrast (*Turdus merula*)

YO	*6808*	27.10.51. juv?	g.	— funnen död, Hamburg, Tyskland, 8.12.53.

Rödstjärt (*Phoenicurus phoenicurus*)

ZOD	2001	12.9.50.	g.	— kontrollerad, Wolfsburg, Niedersachsen, Tyskland, 29.4.53.
ZOE	5366	23.5.52. ad. ♀	g.	— funnen, La Ciotat, Bouches-du-Rhône, Frankrike, 29.4.53.
(R) K	26637	2.9.53. ♀	g.	— kontrollerad, Sandwich, Kent, England, 15.9.53.
ZAT	555	21.9.53. juv. ♂	g.	— dödad, Asso (Como), Lombardia, Italien, 2.11.53.

Rödhake (*Erithacus rubecula*)

ZOE	1981	1.10.51.	g.	— skjuten, nära Cannes, Alpes-Mar., Frankrike, 20.12.52.
ZOE	*2483*	11.10.51,	g.	— funnen, Casteljaloux, Lot-et-Garonne, Frankrike, ca 25.2.53.
ZAS	1753	25.9.52.	g.	— funnen död, Feugarolles, Lot-et-Gar., Frankrike, 29.12.52.
ZAS	1895	29.9.52.	g.	— funnen död, nära Krausnick, Kr. Lübben, Tyskland, 14.4.53.
ZAP	2431	13.10.52.	g.	— kontrollerad, Dornbirn, Vorarlberg, Österrike, ca 5.1.53.
ZAP	2688	20.10.52.	g.	— fångad, Camporosso, Liguria, Italien, 19.12.52.
(R) *H*	*160313*	3.5.53. ad.	g.	— funnen död, Sääksmäki, Tavastehus län, Finland, 31.10.53.
(R) *S*	*14578*	17.10.53.	g.	— funnen död, Bremen, Tyskland, 5.11.53.
(R) S	14692	18.10.53.	g.	— kontrollerad, Düsseldorf, Nordrhein—Westf., Tyskland, 20.12.53.

Hussvala (*Delichon urbica*)

ZO	6709	8.7.48.	juv.	h.	— kontrollerad, Ottenby, h. 9.7.53.
ZOA	3875	14.6.49.	ad.	h.	— kontrollerad, Ottenby, h. 29.6.53.
ZOA	3876	14.6.49.	ad.	h.	— kontrollerad, Ottenby, h. 25.6.53.
ZOA	5027	19.7.49.	juv.	h.	— kontrollerad, Ottenby, h. 22.6.50., 10.7.53.
ZOB	8615	8.7.50.		h.	— kontrollerad, Ottenby, h. 9.6.51., 2.7.53.
ZOD	7191	5.7.51.	juv.	h.	— kontrollerad, Ottenby, h. 29.6.53.
ZOD	7251	6.7.51.	juv.	h.	— kontrollerad, Ottenby, h. 4.7.52., 29.6.53.
ZOD	7254	6.7.51.	juv.	h.	— kontrollerad, Ottenby, h. 26.6.53.
ZOD	7330	6.7.51.	juv.	h.	— kontrollerad, Ottenby, h. 2.7.53.
ZOD	7377	6.7.51.	juv.	h.	— kontrollerad, Ottenby, h. 7.7.52., funnen död, 4 km NE, 4.7.53.
ZOD	7395	6.7.51.	juv.	h.	— kontrollerad, Ottenby, h. 2.7.53.
ZOD	7420	8.7.51.	juv.	h.	— kontrollerad, Ottenby, h. 26.6.53.
ZOD	7766	11.7.51.	juv.	h.	— kontrollerad, Ottenby, h. 7.7.53.
ZAE	3976	7.7.52.		h.	— kontrollerad, Ottenby, h. 2.7.53.
ZAE	3986	7.7.52.		h.	— kontrollerad, Ottenby, h. 26.6.53.
ZAE	3987	7.7.52.		h.	— kontrollerad, Ottenby, h. 26.6.53.
ZAE	4002	7.7.52.	ad.	h.	— kontrollerad, Ottenby, h. 2.7.53.
ZAE	4008	7.7.52.	juv.	h.	— kontrollerad, Ottenby, h. 9.7.53.
ZAE	4027	7.7.52.	juv.	h.	— kontrollerad, Ottenby, h. 25.6.53.
ZAE	4048	7.7.52.	juv.	h.	— kontrollerad, Ottenby, h. 29.6.53.
ZAE	4120	8.7.52.	juv.	h.	— kontrollerad, Ottenby, h. 29.6.53.
ZAE	4139	8.7.52.	juv.	h.	— kontrollerad, Ottenby, h. 29.6.53.
ZAE	4142	8.7.52.	juv.	h.	— kontrollerad, Ottenby, h. 29.6.53.
ZAE	4173	9.7.52.	juv.	h.	— kontrollerad, Ottenby, h. 3.7.53.
ZAE	4183	9.7.52.	juv.	h.	— kontrollerad, Ottenby, h. 3.7.53.
ZAE	4187	9.7.52.	juv.	h.	— kontrollerad, Ottenby, h. 3.7.53.
ZAE	4195	9.7.52.	juv.	h.	— kontrollerad, Ottenby, h. 29.6.53.

Hornuggla (*Asio otus*)

TO	125	19.5.51.	ad.	g.	— funnen, Ribérac, Dordogne, Frankrike, enl. medd. dat. 1.2.53.
TO	*269*	7.9.53.		g.	— funnen död, Billerbeck, Nordrhein—Westf., Tyskland, 6.10.53.

Sparvhök (*Accipiter nisus*)

XO	308	30.9.50.	juv. ♂	g.	— funnen död, ca 20 km NW Sternberk, Morava, Tjeckoslovakien, 27.11.52.
UO	1090	25.8.52.	juv. ♀	g.	— skjuten?, Ayet (ca 20 km S Marmande), Lot-et-Gar., Frankrike, 4.12.52.
XO	507	5.8.53.	juv. ♀	g.	— skjuten, nära Ansbach, Bayern, Tyskland, 18.9.53.

Gravand (*Tadorna tadorna*)

TO	*234*	15.7.53.	pull	h.	— funnen död, Elbemynningen mittemot Cuxhaven, Schlesw.-Holstein, Tyskland, 2.9.53.

Gräsand (*Anas platyrhynchos*)

TO	*109*	21.6.50.	pull.	h.	— skjuten, Gräsgård, Öland (11 km NE), 15.11.52.

Kricka (*Anas crecca*)

UO	1107	3.10.52.		g.	— skjuten, lagunen Albufera, Valencia, Spanien, 13.3.53.

UO	*1210*	3.9.53.		g. — dödad, lagunen Veneta (Venedig), Veneto, Italien, 6.12.53.
UO	*1219*	9.10.53.		g. — skjuten, Mörke (ca 20 km NE Århus), Jylland, Danmark, 22.10.53.

Ejder (*Somateria mollissima*)

SO	*33*	13.6.49.	ad. ♀	h. — fastnat i nät utanför södra Öland, ca 5.8.53.
SO	*109*	9.7.51.	pull.	h. — skjuten, Lyö (nära Fåborg — Fyn), Danmark, 28.10.53.
SO	138	4.9.51.	juv.	h. — funnen döende (♀), Hallig Norderoog, Nordfrisiska öarna, Tyskland, 16.9.53.
SO	*152*	22.7.53.	pull.	h. — skjuten, S Broager (Flensborg fjord), Sönderjylland, Danmark, 24.10.53.
SO	*156*	22.7.53.	pull.	h. — skjuten, utanför Halk-Hoved (ca 15 km ESE Haderslev), L:a Bält, Danmark, 29.10.53.
SO	*157*	23.7.53.	pull.	h. — skjuten, N ön Als, Sönderjylland, Danmark, 23.10.53.

Roskarl (*Arenaria interpres*)

YE	9323	10.8.53.	juv.	g. — skjuten nära St. Nazaire, Loire-Inf., Frankrike, 24.8.53.

Kustsnäppa (*Calidris canutus*)

YO	1619	27.8.48.		g. — skjuten?, nära Dunkerque, Frankrike, 14.5.53.
	504156	23.8.53.	juv.	g. — skjuten, Saltholm, (Öresund), Danmark, 7.9.53.
	504449	30.8.53.	juv.	g. — skjuten, Oistreham, Calvados, Frankrike, 13.9.53.
	504518	31.8.53.	juv.	g. — skjuten, Avnö Fjord (nära Vordingborg), Sjaelland, Danmark, 5.9.53.
	504830	2.9.53.	juv.	g. — skjuten, Torehuse (L:a Bält), Danmark, 12.9.53.

Kärrsnäppa (*Calidris alpina*)

ZO	6077	28.6.48.	juv.	h? — dödad, nära fyren Coubre, Charente-Mar., Frankrike, 2.3.53.
ZOA	*187*	5.9.48.		g. — kontrollerad, Ottenby, 1.8.53.
ZOA	*1001*	11.9.48.		g. — kontrollerad, Ottenby, 15.7.53.
ZOA	*1678*	17.9.48.		g. — kontrollerad, Ottenby, 2.8.53.
ZOA	*2668*	7.10.48.		g. — kontrollerad, Ottenby, 28.7.53.
ZOA	*5299*	31.7.49.	ad.	g. — skjuten, vid Jever, Oldenburg, Tyskland, ca 25.9.52.
ZOA	6629	3.8.49.		g. — 7 km NW Steenbergen, Noordbrabant, Holland, 15.1.53.
ZOA	7238	3.8.49.	ad.	g. — funnen, Chiclana de la Frontera (12 km SE Cadiz), Spanien, 3.12.53.
ZOA	*7281*	4.8.49.	ad.	g. — kontrollerad, Ottenby, 21.7.53.
ZOA	*8358*	15.8.49.	ad.	g. — kontrollerad, Ottenby, 20.7.53.
ZOA	*8407*	15.8.49.	ad.	g. — kontrollerad, Ottenby, 15.7.53.
ZOB	*9144*	22.7.50.	ad.	g. — kontrollerad, Ottenby, 2.8.53.
ZOB	*9320*	29.7.50.	ad.	g. — kontrollerad, Ottenby, 9.8.53.
ZOD	3582	23.9.50.	ad.	g. — kontrollerad, Ottenby, 8.7.53.
ZOD	*7888*	20.7.51.	ad.	g. — kontrollerad, Ottenby, 25.7.53.
ZOD	*7924*	20.7.51.	ad.	g. — kontrollerad, Ottenby, 1.8.53.

ZOD	*8011*	21.7.51.	ad.	g.	— kontrollerad, Ottenby, 5.8.53.
ZOD	8316	23.7.51.	ad.	g.	— skjuten?, St. Pol-de-Léon, Finistère, Frankrike, 20.12.52.
ZOD	*8402*	2.8.51.	ad.	g.	— kontrollerad, Ottenby, 4.8.53.
YO	*7419*	22.7.52.	ad.	g.	— kontrollerad, Ottenby, 19.7.53.
ZAH	9779	27.7.52.	ad.	g.	— dödad, La Camargue, Gard, Frankrike, 4.1.53.
ZAH	9848	27.7.52.	ad.	g.	— skjuten?, l'Aiguillon-sur-Mer, Vendée, Frankrike, 4.1.53.
ZAH	6677	29.7.52.	ad.	g.	— skjuten, nära Sète, Hérault, Frankrike, 3.3.53.
ZR	*2446*	1.8.52.	ad.	g.	— kontrollerad, Ottenby, 2.8.53.
ZR	2910	1.8.52.	ad.	g.	— funnen, Dol-de-Bretagne (ca 30 km SE St. Malo, Ille-et-Vil., Frankrike, ca 25.3.53.
ZV	*7458*	1.8.52.	ad.	g.	— kontrollerad, Ottenby, 3.8.53.
ZAL	*2734*	15.8.52.	ad.	g.	— kontrollerad, Ottenby, 18.7.53.
	500217	17.8.52.	juv.	g.	— skjuten?, St. Pol-de-Léon, Finistère, Frankrike, 20.12.52.
	500245	17.8.52.	juv.	g.	— kontrollerad, Ottenby, 14.7.53.
	500297	17.8.52.	juv.	g.	— kontrollerad, Ottenby, 2.8.53.
	500540	18.8.52.	juv.	g.	— kontrollerad, Ottenby, 19.7.53.
	500772	25.8.52.	juv.	g.	— kontrollerad, Ottenby, 21.7.53.
	500783	25.8.52.	juv.	g.	— kontrollerad, Ottenby, 10.8.53.
	500821	30.8.52.	juv.	g.	— kontrollerad, Ottenby, 5.8.53.
	500827	30.8.52.	juv.	g.	— dödad, Triaize, Vendée, Frankrike, 15.11.52
	500918	31.8.52.	juv.	g.	— dödad nära Lorient, Morbihan, Frankrike, 19.12.53.
(D)	883540	5.9.52.		g.	— skjuten, Champagne-les-Marais, Vendée, Frankrike, 10.12.52.
	503311	22.7.53.	ad.	g.	— dödad, Venedig, Veneto, Italien, 27.9.53.
	503498	24.7.53.	ad.	g.	— skjuten?, Ile d'Oléron, Char.-Mar., Frankrike, 28.11.53.
(R)	54149	30.7.53.	ad.	g.	— skjuten?, Pointe-aux-Herbes (Champ.-les-Marais), Vendée, Frankrike, 23.9.53.
	503863	14.8.53.	ad.	g.	— kontrollerad, Amager, Danmark, 15.8.53.
	503935	17.8.53.	juv.	g.	— kontrollerad, Amager, Danmark, 20.8.53.
	504249	26.8.53.	juv.	g.	— kontr., Ottenby, 2.9.53.; skjuten, Höjer, Sönderjylland, Danmark, 11.9.53.
	504280	27.8.53.	juv.	g.	— dödad, nära Torsminde, Jylland, Danmark, 2.11.53.
	504340	29.8.53.	juv.	g.	— dödad, Rom, Lazio, Italien, 8.11.53.
	504619	1.9.53.	juv.	g.	— funnen utmattad nära Kiel, Schlesw.-Holstein, Tyskland, 10.9.53. (släppt d.21.9.53.)
	504706	2.9.53.	juv.	g.	— kontrollerad, Amager, Danmark, 5.9.53., skjuten nära Amager, 9.9.53.
	504745	2.9.53.	juv.	g.	— skjuten, Seden Strand (Odense Fjord), Fyn, Danmark, 22.9.53.
	504767	2.9.53.	juv.	g.	— skjuten, Eskildsör (Roskilde Fjord), Sjaelland, Danmark, 6.9.53.
	504927	3.9.53.	juv.	g.	— skjuten, Stavns Fjord, Samsö, Danmark, 1.10.53.
ZAX	6439	13.9.53.	juv.	g.	— skjuten, 12 km E Tisted, Jylland, Danmark, ca 5.10.53.
	505168	26.5.53.	juv.	g.	— skjuten?, L'Aiquillon-sur-Mer, Vendée, Frankrike 13.12.53.



Fig. 4. Återfynd av grönbenor och rödbenor, märkta vid Ottenby. Anhopningen på kartan till höger avser 17 fynd. Pilarna syftar på två återfynd vid västafrikanska kusten. (*Recoveries of* Tringa glareola *and* Tringa totanus, *ringed at Ottenby. The accumulation on the map to the right means 17 recoveries. The arrows refer to two recoveries at the West African coast*).

Spovsnäppa (*Calidris ferruginea*)

	504106	22.8.53.	juv.	g.	— skjuten?, Rue, Somme, Frankrike, 6.9.53.
	504107	22.8.53.	juv.	g.	— skjuten, nära Naestved, Sjaelland, Danmark, 30.8.53.

Småsnäppa (*Calidris minuta*)

(R) *K*	*26659*	2.9.53.	juv.	g.	— dödad, Turin, Piemonte, Italien, 17.9.53.

Brushane (*Philomachus pugnax*)

YO	*4314*	29.7.50.	ad. ♂	g.	— skjuten, Caserta, Campania, Italien, 1.3.53.
YO	4706	2.9.50.	♂	g.	— skjuten, Comacchio, Emilia, Italien, 14.3.53.
YO	7242	20.7.52.	juv. ♂	g.	— skjuten, Bologna, Emilia, Italien, 15.3.53.
	504010	21.8.53.	ad. ♀	g.	— skjuten?, La Brosse (nära Malesherbes), Loiret, Frankrike, 20.9.53.
	504079	22.8.53.	juv. ♀	g.	— skjuten, Sassoferrato (Ancona), Marche, Italien, 13.9.53.
	504632	1.9.53.	juv. ♀	g.	— skjuten?, St. Bouize (ca 50 km NE Bourges), Cher, Frankrike, 27.9.53.

Drillsnäppa (*Tringa hypoleucos*)

ZAX	*4725*	9.8.53.	juv.	g.	— dödad, Viterbo, Lazio, Italien, 23.8.53.
	504034	22.8.53.	juv.	g.	— dödad, 30 km S Paris, Frankrike, ca 25.9.53.

Grönbena (*Tringa glareola*)

YO	*4575*	3.8.50.	juv.	g.	— dödad, Arezzo, Toscana, Italien, 16.4.53.
	503584	25.7.53.	juv.	g.	— dödad, Pavia, Lombardia, Italien, 24.8.53.
ZAP	7177	28.7.53.	juv.	g.	— fångad, Venedig, Veneto, Italien, 12.8.53.
ZAP	*7246*	29.7.53.	juv.	g.	— dödad, ca 10 km S. Béziers, Hérault, Frankrike, 17.8.53.
ZAX	*4818*	2.8.53.	juv.	g.	— dödad, Modena, Emilia, Italien, 23.8.53.
ZAX	*4858*	4.8.53.	juv.	g.	— dödad, Ferrara, Emilia, Italien, 23.8.53.
ZAX	4883	5.8.53.	juv.	g.	— skjuten, Arfons (ca 30 km S Castres), Tarn, Frankrike, 29.9.53.
ZAX	*4772*	10.8.53.	juv.	g.	— dödad, Turin, Piemonte, Italien, 30.8.53.
ZAX	*4785*	11.8.53.	juv.	g.	— dödad, Alessandria, Piemonte, Italien, 30.8.53.
ZAX	*4969*	12.8.53.	juv.	g.	— dödad, Vercelli, Piemonte, Italien, 30.8.53.
	504231	26.8.53.	juv.	g.	— dödad, Vercelli, Piemonte, Italien, 12.9.53.
	504856	2.9.53.	juv.	g.	— dödad, nära Vigevano, Lombardia, Italien, 11.9.53.

Rödbena (*Tringa totanus*)

YO	5839	7.7.51.	juv.	g.	— skjuten?, La Nouvelle, Aude, Frankrike, 14.7.53.
YO	5877	10.7.51.	juv.	g.	— dödad, Royan, Charente-Mar., Frankrike 10.5.53.
	501689	10.7.53.	juv.	g.	— skjuten?, Le Crotoy, Somme, Frankrike, 20.8.53.
	501738	11.7.53.	juv.	g.	— skjuten?, Ile de Ré, Char.-Mar., Frankrike 12.8.53.
	501759	12.7.53.	juv.	g.	— dödad, nära Aveiro, Beira Litoral, Portugal, 20.8.53.
YA	*6564*	25.7.53.	juv.	g.	— dödad, Cremona, Lombardia, Italien, 28.8.53.

	503624	26.7.53.	juv.	g. — skjuten?, Lavau sur Loire, Loire-Inf., Frankrike, 23.8.53.
(R) G	*54271*	31.7.53.	juv.	g. — skjuten, Ile d'Oléron, Char.-Mar, Frankrike, 15.8.53.
(R) *G*	*54646*	6.8.53.	juv.	g. — fångad, Esnaudes (11 km NE La Rochelle), Char.-Mar., Frankrike, 25.8.53.
(R) *G*	*54746*	31.8.53.	juv.	g. — dödad, 15 km NE Rue, Somme, Frankrike, 11.10.53.

Större strandpipare (*Charadrius hiaticula*)

ZOB	8331	5.7.51.	juv.	g. — dödad, St. Valery-sur-Somme, Somme, Frankrike, 19.7.53.
ZAL	8115	21.7.52.	ad.	g. — fångad, Morteau, Doubs, Frankrike, 25.3.53.
(D)	883527	1.9.52.		g. — skjuten, 7 km SW Rochefort, Char.-Mar., Frankrike, 1.6.53.
(R) H	191347	11.7.53.	juv.	g. — dödad, Lanester Lorient, Morbihan, Frankrike, 26.9.53.
(R) H	191367	15.7.53.	juv.	g. — dödad, nära Stes Maries, Bouches-du-Rhône, Frankrike, 17.9.53.
	502923	20.7.53.	juv.	g. — skjuten?, Talmont sur Gironde (ca 30 km S Saintes), Char.-Mar., Frankrike, 9.8.53.
	505111	12.9.53.	juv.	g. — St. Germain-Lembron, Puy-de-Dôme, Frankrike, 10.10.53.

Tofsvipa (*Vanellus vanellus*)

XO	*242*	14.6.51.	pull.	h. — fångad, Irûn, Guipûzcoa, Spanien, 2.3.53.

Strandskata (*Haematopus ostralegus*)

UO	*1211*	8.9.53.	ad.	g. — funnen död, nära Uithuizen, Groningen, Holland, enl. medd. dat. d. 19.9.53.

Silvertärna (*Sterna paradisaea*)

YO	5483	3.6.51.	ad.	h. — kontrollerad, Ottenby, h. 6.6.53.
YO	5521	9.6.51.	ad.	h. — kontrollerad, Ottenby, h. 7.6.53.
YO	5529	9.6.51.	ad.	h. — kontrollerad, Ottenby, h. 7.6.53.
YO	6957	5.6.52.	ad.	h. — kontrollerad, Ottenby, h. 6.6.53.

Skrattmås (*Larus ridibundus*)

UO	*807*	16.6.50.	pull.	h. — skjuten, S:a Markör (Kalmarsund), 35 km NW, 24.4.53.

Gustaf Danielsson har sammanställt ringmärkningstabellen (tabell 2) och Sten Österlöf ritat de båda återfyndskartorna, för vilken hjälp förf. är mycket tacksam.

Summary: **The activities of the ornithological station at Ottenby in 1953. (Ottenby Bird Station Report No. 17.)**

As in the preceding year, the activity of the Bird Station in 1953 was made possible mainly by a grant from the Department of Agriculture. Ringing and continuous observations were carried on from April 1 to Oct. 31; 13.988 birds, all passage-migrants except a few hundred local nesting-birds, were ringed, and a little more than 270.000 were recorded on diurnal southward passage. Two species new to Ottenby were trapped or seen: *Carpodacus erythrinus* and *Streptopelia decaocto*. The first two *Oceanodroma leucorrhoa* from Ottenby are also reported, one from 1948 and one from 1953 (both killed at the light-house).

As in previous reports, special attention is paid to the Swift (*Apus apus*); certain new detàils could be added to our knowledge of the migratory behaviour of this species.

Several northern *Passeres* appeared in unusual numbers, especially during September and October, as may be seen from a comparison between ringing figures for these species in 1953 and in previous years, given in Table 2 (e. g., *Garrulus glandarius, Loxia curvirostra, Parus ater*). The year was a good one also for *Dendrocopos major, Asio otus* and for several waders, such as *Limosa lapponica* and *Philomachus pugnax.* However, the local trapping conditions, too, were unusually favourable this year as far as waders were concerned, so that the high ringing figures for certain species do not necessarily imply a rise in the number of passage-migrants: the figures for birds observed on passage (Table 1) should also be consulted.

Between July 8 and Aug. 11, 34 among the *Calidris alpina* trapped on the shore did carry rings which they had received in earlier years at Ottenby (24) or at other north European bird stations (7 at Revtangen i Norway, 3 at Amager in Denmark). Among these and other dunlins recovered (53 in all), 5 had been ringed as long as five years ago.

Recovery percentages for 15 species of which more than 1.000 individuals have been ringed at the Bird Station are given on p. 66. *Tringa totanus* heads the list with 2,7 % whereas the ringing of 1.026 *Regulus regulus* has not as yet given any results. On the other hand, certain ducks and birds of prey not included in this list have yielded between 10 % and 20 % recoveries.