VÅR FÅGELVÄRLD

ÅRG. 15 1956 NR 3

Verksamheten vid Ottenby fågelstation 1955

(Meddelande nr 21 från Ottenby fågelstation)

Av

WOLF JENNING

Arbetet vid Ottenby under stationens nionde verksamhetsår möjliggjordes åter genom att Kungl. Maj:t — för femte året i följd — beviljade ett anslag ur Jaktvårdsfonden för ersättning åt ringmärkare och observatörer vid föreningens båda fågelstationer. Glädjande nog kunde verksamheten komma i gång redan under första hälften av april och pågick som vanligt till slutet av oktober. Följande personer tjänstgjorde som observatörer eller ringmärkare: SUNE BERG, EINAR BRUN, ROBERT BÜNSOW, ANDERS DEHLIN, ROLF GILLIN, GÖRAN HÖGSTEDT, WOLF JENNING, ROGER JOHANSSON, JÖRGEN KARLSSON, GÖRAN LILJEDAHL, JAN W. MASCHER, SVEN MATHIASSON, OLLE MAURITZON, HARRY MYHRBERG, ÅKE NORDH, JERRY NYMAN, GÖRAN OLSSON, ARNE ORVELIUS, STAFFAN REINIUS, LARS SJÖHOLM, SÖREN SVENSSON, STAFFAN ULFSTRAND, KERSTIN ÖHLIN och TORGNY ÖSTGREN. Dessutom medverkade som under tidigare år ett stort antal frivilliga medarbetare.

Sträcket 1955

Vårsträcket kom i gång ovanligt sent. Detta påverkade fångstresultatet för vissa tidiga arter, vilka i vanliga fall passerat udden redan när stationen öppnas. Koltrast och järnsparv uppträdde i riklig mängd under andra hälften av april, vilket återspeglas i märkningssiffrorna, som för båda arterna blev avsevärt högre än under något tidigare år. För rödhake och rödstjärt kunde skönjas en viss förskjutning av sträcket in i maj, och för ärt-, törn- och lövsångare en förskjutning in i juni. Även kärrsnäpporna tycktes vara försenade. Den 30 maj iakttogs på Västrevets södra del en otrolig

koncentration av kärrsnäppor. Antalet uppskattades till minst 6.000. Senare på dagen observerades ca 4.000 sträcka högt över lunden i NNE riktning.

Under våren förekom flera kalluftinbrott med retursträck som följd. Ett av de mera iögonfallande har redan behandlats i denna tidskrift (av B. DANIELSSON i VF 15: 54).

Kontinuerliga sträckobservationer påbörjades som vanligt den 1 juni. Den under många år efterlängtade kontakten mellan observationsplatsen och stationsbyggnaden kom i gång den 13 juni genom upprättande av en lokaltelefon.

Det mest märkliga under höststräcket var den påtagliga bristen på *Calidris*-snäppor jämfört med tidigare år. När den stora kärrsnäpprushen, som eljest äger rum vid månadsskiftet juli/augusti, uteblev, trodde man att detta antingen berodde på det vackra vädret eller också på att fåglarna anlänt senare på häckplatserna och icke ännu hunnit klara av häckningsbestyren — de skulle i varje fall säkerligen komma senare. Men något sträck att tala om blev aldrig av. Sannolikt tog det andra vägar. Enligt meddelande från H. HOLGERSEN var kärrsnäppefrekvensen vid norska kusten emellertid normal, och återfynden under vinterhalvåret 1955/56 kom från de vanliga platserna. Medan år 1954 gav det största antalet sträckande kärrsnäppor i stationens historia, blev årets resultat det lägsta. För kustpipare erhölls också en lägre siffra än normalt. Antalet dagsträckande myrspovar ökade i stället åter till det normala efter fjolårets bottenrekord. Jämfört med fjolårets resultat minskade antalet sträckobserverade spovsnäppor i samma proportion som kärrsnäpporna, dock utan att falla under det normala (1954 var ett toppår för arten). Kustsnäppan visade likaså normalsiffror.

Av stare noterades totalt 91.000 utsträckande, varav nära 17.000 den 6 juli. Bland tornsvalorna var aktiviteten tämligen livlig. Över 10.000 exemplar »sträckte» den 3, 4 och 16 juli. Den 27 juni, då de också var i rörelse, flög de först norrut, men sedan vinden kantrat mot syd gick »sträcket» åter sydvart.

Den 20 och 21 september ägde ett för Ottenby-förhållanden intensivt sparvhöksträck rum. Av säsongens 497 sparvhökar passerade 83 under dessa båda dagar.

Under hösten uppträdde på många håll i landet fler nötskrikor än vanligt. Denna invasion var märkbar även vid Ölands södra udde. I mitten av oktober kunde vid flera tillfällen observeras hur upp till



Fig. 1. Den 16.7.55 passerade över 50.000 tornsvalor flyttfågelkontrollen vid Ölands södra udde. Foto: RUNE KANGER. (*Over 50.000 Apus apus were seen flying out over the sea on 16.7.55 at Ottenby Bird Station.*)

ett hundratal nötskrikor samtidigt försökte lämna udden. De kom i regel så högt att man trots de karakteristiska dragen måste använda kikaren för att artbestämma dem. Redan innan de kom fram till udden förlorade många modet och fällde i fyrträdgården. Flertalet flög dock ut en bit över havet under fortsatt stigning, tills de plötsligen vände och som stenar föll ned mot trädgården, vilken de efter en stunds vila lämnade för att flyga norrut igen och försöka på nytt vid ett senare tillfälle. Åtskilliga sågs emellertid verkligen lämna Öland.

Efter ett års uppehåll förekom domherre åter i större antal. Ovanligt många blåmesar var också i rörelse under oktober. Däremot observerades inga stjärtmesar.

Det sjöfågelsträck som går förbi Ölands södra udde består, som framhållits tidigare, helt och hållet av fåglar som flyttar på utsidan

av ön. Av de kraftiga rörelserna genom Kalmarsund märker man däremot inget från fågelstationen. I 1952 års rapport (jfr VF 12: 149) delgavs några siffror från sjöfågelsträcket genom Sundet, där fåglarna räknats under några spridda dagar under oktober och november. Det har sedan dess varit ett önskemål att erhålla kvantitativa uppgifter för en längre sammanhängande period. På grund av brist på medel och lämplig personal kunde sådana räkningar påbörjas först hösten 1955. Som observationsplats valdes då Revsudden på Skäggenäs, där sundet endast är 3,3 km brett och en koncentration av sträcket således kunde väntas. Som observatörer tjänstgjorde OLLE LILJEDAHL och DAVID LUNDEGÅRD, och verksamheten pågick under tiden 5—24 oktober.

Tabell 1. Jämförelse mellan sjöfågelsträcket genom Kalmarsund och utanför Öland under tiden 5—24 oktober 1955

	Revsudden	Ottenby
Sångsvan (*Cygnus cygnus*)	74	18
Knölsvan (*C. olor*)	12	—
Grågås (*Anser anser*)	82	5
Blåsgås (*A. albifrons*)	—	380
Sädgås (*A. fabalis*)	33	120
Prutgås (*Branta bernicla*)	1.500	370
Vitkindad gås (*B. leucopsis*)	—	120
Obest. svartvita gäss (*Branta spp.*)	100	10
Obest. gäss (*Anser/Branta*)	170	380
Gravand (*Tadorna tadorna*)	—	15
Gräsand (*Anas platyrhynchos*)	77	32
Kricka (*A. crecca*)	29	68
Bläsand (*A. penelope*)	450	2.000
Stjärtand (*A. acuta*)	53	880
Skedand (*A. clypeata*)	3	—
Vigg (*Aythya fuligula*)	200	1
Bergand (*A. marila*)	540	18
Knipa (*Bucephala clangula*)	95	40
Alfågel (*Clangula hyemalis*)	660	52
Ejder (*Somateria mollissima*)	56.000	20.000
Sjöorre (*Melanitta nigra*)	1.600	1.300
Svärta (*M. fusca*)	7.900	1.200
Storskrake (*Mergus merganser*)	28	28
Småskrake (*M. serrator*)	1.500	950
Obest. andfåglar (*Anatidae spp*)	—	2.100
Skarv (*Phalacrocorax carbo*)	4	—
Dopping (*Podiceps spp.*)	14	—
Lom (*Colymbus spp.*)	780	73

I vidstående tabell jämförs sjöfågelsträcket genom Kalmarsund med det som passerar förbi Ottenby. Mot 72.000 fåglar som tagit vägen genom Kalmarsund står 30.000 som inräknats av Ottenby-observatören.

Bland övriga iakttagna arter torde följande vara av särskilt intresse. Ett par korpar besökte stationsområdet vid flera tillfällen under augusti. En svart kråka visade sig den 24.4. och 11.—14.7. Två rosenfinkar infångades den 19.5., resp. 11.9. Korsnäbbar uppträdde redan under juni. Kornsparv sågs den 14.5. och 22.6. Fältpiplärka iakttogs den 26.5. (en) och den 21.8. (två). En gråärla lämnade udden den 1.7. Även i år observerades en härfågel vid stationen (1.5.). Den 2.10. infångades en mellanspett, stationens första. Halsbandflugsnappare observerades vid flera tillfällen både i fyrträdgården och i lunden under tiden 3.—29.5. Turturduva visade sig den 28.5. och (två) den 7.6., medan en turkduva besökte fyrträdgården den 28.6. Under sommaren sågs vid många tillfällen en stäpphök (♀) runt stationen, säkerligen hela tiden samma fågel. Under augusti företog den flerfaldiga sträckförsök, och ibland kunde det ta timmar innan den återvände. Skrikörn observerades vid ett par tillfällen under andra hälften av oktober, en gång tillsammans med två unga kungsörnar. En brun glada visade sig under hela augusti och första hälften av september. Mindre sångsvan sågs redan den 16 oktober.

Tabell 2. Totalsumma vid Ottenby dagsträckande fåglar 1 juni—29 oktober 1955

Endast sådana fåglar har här medtagits, vilka av observatören iakttagits sträckande ut över havet eller i vissa fall insträckande därifrån, kallat —sträck (minussträck eller insträck). Siffrorna är minimisiffror och omfattar endast dagsträck. (*Total number of diurnal migrants seen flying south over the sea at Ottenby Bird Station between June 1st and October 29th, 1955. Birds arriving over the sea from the south on »reversed migration» are listed with a minus sign before the figure.*)

	ex.		ex.
Kråka (*Corvus corone cornix*) ...	590	Domherre (*Pyrrhula pyrrhula*) ...	115
Råka (*Corvus frugilegus*)	51	Korsnäbb (*Loxia sp.*)	85
Kaja (*Corvus monedula*)	86	Bofink (*Fringilla coelebs*)	24.000
Nötkråka (*Nucifraga caryocatactes*)	7	Bergfink (*Fr. montifringilla*) ...	12.000
Nötskrika (*Garrulus glandarius*) ..	100	Obest. finkar (*Fringilla spp.*) ...	900
Stare (*Sturnus vulgaris*)	91.000	Gulsparv (*Emberiza citrinella*) ...	5.500
Grönfink (*Chloris chloris*)	1.600	Ortolansparv (*E. hortulana*)	26
Steglits (*Carduelis carduelis*)	170	Sävsparv (*E. schoeniclus*)	140
Grönsiska (*C. spinus*)	4.000	Snösparv (*Plectrophenax nivalis*)	19
Gråsiska (*C. flammea*)	35	Pilfink (*Passer montanus*)	3
Vinterhämpling (*C. flavirostris*) ..	90	Trädlärka (*Lullula arborea*)	107
Hämpling (*C. cannabina*)	15.500	Sånglärka (*Alauda arvensis*)	1.700

	ex.
Berglärka (*Eremophila alpestris*)	55
Fältpiplärka (*Anthus campestris*)	2
Trädpiplärka (*A. trivialis*)	1.300
Ängspiplärka (*A. pratensis*)	1.300
Rödstrup. piplärka (*A. cervinus*)	11
Skärpiplärka (*A. spinoletta*)	200
Obest. piplärkor (*Anthus spp.*)	66
Gulärla (*Motacilla flava*)	2.600
Gråärla (*M. cinerea*)	1
Sädesärla (*M. alba*)	20.000
Obest. ärlor (*Motacilla spp.*)	230
Talgoxe (*Parus major*)	24
Blåmes (*P. caeruleus*)	270
Varfågel (*Lanius excubitor*)	2
Snöskata (*Turdus pilaris*)	160
Dubbeltrast (*T. viscivorus*)	8
Taltrast (*T. ericetorum*)	100
Rödvingetrast (*T. musicus*)	50
Koltrast (*T. merula*)	1
Järnsparv (*Prunella modularis*)	33
Ladusvala (*Hirundo rustica*)	6.400 —190
Hussvala (*Delichon urbica*)	3.200 —290
Backsvala (*Riparia riparia*)	1.900 —33
Obest. svalor (*Hirundo, Delichon, Riparia*)	12.000
Obest. småfåglar (*Passeriformes spp.*)	460
Tornsvala (*Apus apus*)	120.000 —6.400
Pilgrimsfalk (*Falco peregrinus*)	18
Lärkfalk (*F. subbuteo*)	18
Stenfalk (*F. columbarius*)	22
Tornfalk (*F. tinnunculus*)	53
Obest. falkar (*Falco spp.*)	3
Fjällvråk (*Buteo lagopus*)	43
Ormvråk (*B. buteo*)	20
Brun kärrhök (*Circus aeruginosus*)	25
Blå kärrhök (*C. cyaneus*)	7
Stäpphök (*C. macrourus*)	1
»Stängshök» (*C. pygargus/macrourus*)	6
Obest. kärrhökar (*Circus spp.*)	3
Duvhök (*Accipiter gentilis*)	3
Sparvhök (*A. nisus*)	497
Havsörn (*Haliaeetus albicilla*)	1
Bivråk (*Pernis apivorus*)	31
Obest. vråkar (*Buteo/Pernis*)	3
Fiskgjuse (*Pandion haliaëtus*)	38
Obest. rovfåglar (*Falconiformes spp.*)	3
Häger (*Ardea cinerea*)	8
Sångsvan (*Cygnus cygnus*)	26
Knölsvan (*C. olor*)	17
Grågås (*Anser anser*)	305
Bläsgås (*A. albifrons*)	380
Sädgås (*Anser fabalis*)	122
Vitkindad gås (*Branta leucopsis*)	170
Prutgås (*B. bernicla*)	430

	ex.
Obest. svartvita gäss (*Branta spp.*)	10
Obestämda gäss (*Anser/Branta*)	420
Gravand (*Tadorna tadorna*)	3.640
Gräsand (*Anas platyrhynchos*)	755
Kricka (*A. crecca*)	1.030
Bläsand (*A. penelope*)	8.500
Stjärtand (*A. acuta*)	3.030
Skedand (*A. clypeata*)	604
Brunand (*Aythya ferina*)	2
Vigg (*A. fuligula*)	32
Bergand (*A. marila*)	68
Knipa (*Bucephala clangula*)	57
Alfågel (*Clangula hyemalis*)	82
Ejder (*Somateria mollissima*)	21.800
Sjöorre (*Melanitta nigra*)	1.650
Svärta (*M. fusca*)	1.270
Storskrake (*Mergus merganser*)	88
Småskrake (*M. serrator*)	1.060
Obest. skrakar (*Mergus spp.*)	5
Obest. andfåglar (*Anseriformes spp.*)	12.000
Storskarv (*Phalacrocorax carbo*)	3
Storlom (*Colymbus articus*)	70
Smålom (*C. stellatus*)	5
Obest. lommar (*Colymbus spp.*)	82
Ringduva (*Columba palumbus*)	1.700
Skogsduva (*C. oenas*)	2.400
Obest. duvor (*Columba spp.*)	810
Myrspov (*Limosa lapponica*)	1.460
Rödspov (*L. limosa*)	11
Storspov (*Numenius arquata*)	2.470
Småspov (*N. phaeopus*)	313
Obest. spovar (*Numenius spp.*)	34
Enkelbeckasin (*Capella gallinago*)	63
Dvärgbeckasin (*Lymnocryptes minimus*)	1
Smalnäbb. simsnäppa (*Phalaropus lobatus*)	2
Roskarl (*Arenaria interpres*)	69
Kustsnäppa (*Calidris canutus*)	790
Kärrsnäppa (*C. alpina*)	7.700
Spovsnäppa (*C. ferruginea*)	150
Småsnäppa (*C. minuta*)	14
Mosnäppa (*C. temminckii*)	1
Sandlöpare (*C. alba*)	18
Brushane (*Philomachus pugnax*)	310
Myrsnäppa (*Limicola falcinellus*)	4
Drillsnäppa (*Tringa hypoleucos*)	220
Grönbena (*T. glareola*)	2.900
Skogssnäppa (*T. ochropus*)	66
Rödbena (*T. totanus*)	5.500
Svartsnäppa (*T. erythropus*)	130
Gluttsnäppa (*T. nebularia*)	660
Obest. storsnäppor (*Philomachus/Tringa spp.*)	89
Större strandpipare (*Charadrius hiaticula*)	1.450

	ex.
Mindre strandpipare (*Ch. dubius*)	4
Fjällpipare (*Ch. morinellus*)	1
Obest. småvadare (*Small waders spp.*)	550
Ljungpipare (*Pluvialis apricaria*)	110
Kustpipare (*P. squatarola*)	382
Tofsvipa (*Vanellus vanellus*)	1.800
Skärfläcka (*Recurvirostra avosetta*)	71
Strandskata (*Haematopus ostralegus*)	5.900
Trana (*Grus grus*)	610
Svarttärna (*Chlidonias niger*)	100
Skräntärna (*Hydroprogne tschegrava*)	46
Kentsk tärna (*Sterna sandvicensis*)	44

	ex.
Fisk-/Silvertärna (*St. hirundo/paradisaea*)	1.390
Småtärna (*St. albifrons*)	338
Obest. tärnor (*Sterna spp.*)	206
Dvärgmås (*Larus minutus*)	7
Skrattmås (*L. ridibundus*)	6.200
Fiskmås (*L. canus*)	318
Gråtrut (*L. argentatus*)	249
Silltrut (*L. fuscus*)	530
Havstrut (*L. marinus*)	19
Obest. måsar (*Larus spp.*)	303
Labb (*Stercorarius parasiticus*)	4
Obest. alkor (*Alca/Uria*)	1
Sothöna (*Fulica atra*)	1
Orre (*Lyrurus tetrix*)	1

Häckfåglar

Några sommargyllingar visade sig i lunden även detta år (28.5.—23.7.), men häckning kunde dock inte konstateras. Liten flugsnappare häckade i minst två par. I södra delen av lunden hittades två bon av stenknäck endast 30 m från varandra. Båda innehöll tre ungar. Vid en inventering i Sandvik den 13.6. noterades 33 bon av skärfläcka med varierande äggantal från 1 till 10. Beträffande bona med ett ägg kan det möjligen röra sig om ströägg i stället för verkliga bon. Flertalet innehöll normalt antal ägg (3—4) medan 11 innehöll fler ägg. Äggens fördelning framgår av följande sammanställning:

Antal ägg:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Antal bon:	3	1	5	13	1	1	1	4	2	2

Som synes förekommer två frekvenstoppar, en vid 4 ägg (normal kull) och en vid 8, vilket tyder på att det vid de större kullarna är fråga om två honor. Eftersom den ruvande fågeln inte gärna kan värma så många ägg samtidigt och det troligen inte är samma ägg som får del av den erforderliga värmen efter avlösningen, torde kläckningen starkt försämras vid så högt äggantal. — Vid inventeringen hittades även ett bo av småtärna.

Antalet knölsvanar som översomrar utanför södra udden ökar från år till år. De räknades den 27.7. och 15.8., och vid båda tillfällena erhölls siffran 325.

Fångst och ringmärkning 1955

Under våren anskaffades 30 nya vadarfällor tack vare en berömvärd insats av Ornitologiska klubben i Vetlanda, som egenhändigt till-

Fig. 2. Bo av småtärna i Sandvik (Ottenby) juni 1955. Foto: ARNE ORVELIUS. (*Nest of Sterna albifrons at Ottenby Bird Station, June 1955.*)

verkade dem till en endast ringa kostnad. Dessa fällor var i flera avseenden överlägsna de tidigare använda, och tack vare dem gick fångstsiffrorna för ärlor, piplärkor och stenskvättor åter i höjden. Tyvärr förstördes emellertid ungefär halva antalet fällor vid en överraskande orkan i mitten av september.

Förhoppningen att totalsiffran för ringmärkta fåglar under året skulle passera 100.000-strecket grusades tyvärr, då endast 9.522 exemplar kunde förses med ringar. Detta berodde framför allt på den förvånansvärt ringa förekomsten av *Calidris*-snäppor under sommaren och hösten. Medan i vanliga fall ett par tre tusen kärrsnäppor fångas per år, utgörande 20—30 % av totalfångsten, under-

steg årets resultat t. o. m. 1951 års låga notering. Endast 445 kärrsnäppor (= knappt 5 % av totalsumman fåglar för året) märktes 1955; 119 av dessa hänför sig till vårsträcket. Däremot var fångsten av *Tringa*-snäppor mycket god, för drillsnäppa erhölls t. o. m. den högsta siffran hittills. Som nya märkningsarter för stationen tillkom mellanspett och småtärna, vardera i ett exemplar.

Under högtrycksvädret under augusti konstaterades vid flera tillfällen en större ansamling av sävsångare på Sälön. Försök med spegelnät gav till resultat att årssumman för denna art blev praktiskt taget lika hög som totalsumman för de övriga åren. Tyvärr tillåter i regel inte väderleksförhållandena på platsen ett mera flitigt användande av denna fångstmetod.

Under nötskrikeinvasionen infångades 36 exemplar, dubbelt så många som under de gångna åren tillsammans. Med ökad personal hade denna siffra kunnat drivas i höjden avsevärt.

För att underlätta ringmärkarnas arbete har stationsledningen låtit I. Ö. Mekaniska i Bankeryd konstruera en ringautomat. Ett provexemplar hann ned till stationen tre veckor innan denna stängdes för året och visade sig helt motsvara förväntningarna. Arbetssättet för denna automat torde framgå av bilden (p. 173).

Under sommaren bereddes vet. med. dr KARL BORG tillfälle att ta blodprov på de infångade vadarna för parasitologisk undersökning. Provtagningen skedde under vardera en vecka i början och i slutet av augusti. Då bearbetningen av materialet ännu inte slutförts, kommer resultatet att redovisas senare.

Tabell 3. Vid Ottenby märkta fåglar

(*Birds ringed at Ottenby*)

Art (*Species*)	Antal märkta t. o. m. 1954 (*Number ringed up to 1954*)	Märkta 1955 (*Ringed 1955*)	Totalsumma (*Total sum*)	Återfynd (*Recoveries*)
Kråka (*Corvus corone*)	1	—	1	—
Kaja (*Corvus monedula*)	2	—	2	1
Skata (*Pica pica*)	1	—	1	—
Nötkråka (*Nucifraga caryocatactes*)	4	2	6	—
Nötskrika (*Garrulus glandarius*)	18	36	54	1
Stare (*Sturnus vulgaris*)	3.752	967	4.719	58
Stenknäck (*Coccothraustes coccothraustes*)	1	7	8	—

Tabell 3 forts.

Art (*Species*)	Antal märkta t. o. m. 1954 (*Number ringed up to 1954*)	Märkta 1955 (*Ringed 1955*)	Total-summa (*Total sum*)	Återfynd (*Recoveries*)
Grönfink (*Chloris chloris*)	408	24	432	1
Steglits (*Carduelis carduelis*)	22	1	23	—
Grönsiska (*Carduelis spinus*)	782	22	804	7
Gråsiska (*Carduelis flammea*)	48	—	48	—
Vinterhämpling (*Carduelis flavirostris*)	13	1	14	—
Hämpling (*Carduelis cannabina*)	262	40	302	8
Domherre (*Pyrrhula pyrrhula*)	251	38	289	2
Rosenfink (*Carpodacus erythrinus*)	2	2	4	—
Mindre korsnäbb (*Loxia curvirostra*)	36	—	36	—
Bofink (*Fringilla coelebs*)	678	150	828	4
Bergfink (*Fringilla montifringilla*)	209	31	240	1
Gulsparv (*Emberiza citrinella*)	1.279	42	1.321	8
Ortolansparv (*Emberiza hortulana*)	37	8	45	1
Videsparv (*Emberiza rustica*)	1	—	1	—
Sävsparv (*Emberiza schoeniclus*)	153	19	172	2
Lappsparv (*Calcarius lapponicus*)	9	—	9	—
Snösparv (*Plectrophenax nivalis*)	1	—	1	—
Gråsparv (*Passer domesticus*)	96	11	107	—
Pilfink (*Passer montanus*)	22	1	23	—
Trädlärka (*Lullula arborea*)	1	—	1	—
Sånglärka (*Alauda arvensis*)	93	7	100	5
Berglärka (*Eremophila alpestris*)	2	—	2	—
Trädpiplärka (*Anthus trivialis*)	123	11	134	—
Ängspiplärka (*Anthus pratensis*)	687	53	740	5
Rödstrupig piplärka (*Anthus cervinus*)	173	—	173	2
Skärpiplärka (*Anthus spinoletta*)	1.169	11	1.180	9
Gulärla (*Motacilla flava*)	1.031	225	1.256	5
Sädesärla (*Motacilla alba*)	5.051	363	5.414	24
Trädkrypare (*Certhia familiaris*)	114	—	114	—
Talgoxe (*Parus major*)	346	32	378	4
Blåmes (*Parus caeruleus*)	450	47	497	1
Svartmes (*Parus ater*)	337	—	337	—
Entita (*Parus palustris*)	1	—	1	—
Talltita (*Parus atricapillus*)	1	—	1	—
Stjärtmes (*Aegithalos caudatus*)	116	—	116	—
Varfågel (*Lanius excubitor*)	51	2	53	1
Törnskata (*Lanius collurio*)	1.253	256	1.509	2
Rödhuvad törnskata (*Lanius senator*)	1	—	1	—
Sidensvans (*Bombycilla garrulus*)	13	—	13	—
Grå flugsnappare (*Muscicapa striata*)	900	129	1.029	3

Tabell 3 forts.

Art (*Species*)	Antal märkta t. o. m. 1954 (*Number ringed up to 1954*)	Märkta 1955 (*Ringed 1955*)	Total-summa (*Total sum*)	Återfynd (*Recoveries*)
Svartvit flugsnappare (*Muscicapa hypoleuca*)	1.185	107	1.292	7
Halsbandsflugsnappare (*Muscicapa albicollis*)	11	3	14	—
Liten flugsnappare (*Muscicapa parva*)	46	13	59	1
Kungsfågel (*Regulus regulus*)	1.293	140	1.433	—
Gransångare (*Phylloscopus collybita*)	256	40	296	—
Lövsångare (*Phylloscopus trochilus*)	5.263	704	5.967	4
Grönsångare (*Phylloscopus sibilatrix*)	479	16	495	—
Gräshoppsångare (*Locustella naevia*)	12	4	16	—
Trastsångare (*Acrocephalus arundinaceus*)	3	—	3	—
Rörsångare (*Acrocephalus scirpaceus*)	76	34	110	—
Kärrsångare (*Acrocephalus palustris*)	2	—	2	—
Sävsångare (*Acrocephalus schoenobaenus*)	161	159	320	2
Härmsångare (*Hippolais icterina*)	381	70	451	3
Hökfärgad sångare (*Sylvia nisoria*)	51	14	65	—
Trädgårdssångare (*Sylvia borin*)	803	151	954	4
Svarthätta (*Sylvia atricapilla*)	455	116	571	3
Törnsångare (*Sylvia communis*)	1.682	433	2.115	9
Ärtsångare (*Sylvia curruca*)	2.711	422	3.133	5
Snöskata (*Turdus pilaris*)	17	1	18	1
Dubbeltrast (*Turdus viscivorus*)	9	1	10	—
Taltrast (*Turdus ericetorum*)	1.041	156	1.197	16
Rödvingetrast (*Turdus musicus*)	127	30	157	7
Ringtrast (*Turdus torquatus*)	2	—	2	—
Koltrast (*Turdus merula*)	104	49	153	3
Stenskvätta (*Oenanthe oenanthe*)	318	32	350	3
Buskskvätta (*Saxicola rubetra*)	89	32	121	1
Rödstjärt (*Phoenicurus phoenicurus*)	3.726	563	4.289	12
Svart rödstjärt (*Phoenicurus ochruros*)	31	6	37	—
Näktergal (*Luscinia luscinia*)	86	24	110	1
Blåhake (*Luscinia svecica*)	37	5	42	—
Rödhake (*Erithacus rubecula*)	10.699	1.541	12.240	48
Järnsparv (*Prunella modularis*)	64	53	117	—
Gärdsmyg (*Troglodytes troglodytes*)	351	29	380	—
Ladusvala (*Hirundo rustica*)	83	5	88	—
Hussvala (*Delichon urbica*)	4.299	3	4.302	307
Backsvala (*Riparia riparia*)	1	1	2	—
Tornsvala (*Apus apus*)	900	41	941	12

Tabell 3 forts.

Art (*Species*)	Antal märkta t. o. m. 1954 (*Number ringed up to 1954*)	Märkta 1955 (*Ringed 1955*)	Totalsumma (*Total sum*)	Återfynd (*Recoveries*)
Nattskärra (*Caprimulgus europaeus*)	46	13	59	1
Härfågel (*Upupa epops*)	1	—	1	—
Kungsfiskare (*Alcedo atthis*)	1	—	1	—
Gröngöling (*Picus viridis*)	19	3	22	—
Större hackspett (*Dendrocopos major*)	69	1	70	—
Mindre hackspett (*Dendrocopos minor*)	2	—	2	—
Mellanspett (*Dendrocopos medius*)	—	1	1	—
Göktyta (*Jynx torquilla*)	78	7	85	1
Gök (*Cuculus canorus*)	19	5	24	—
Pärluggla (*Aegolius funereus*)	5	—	5	—
Hornuggla (*Asio otus*)	31	3	34	5
Kattuggla (*Strix aluco*)	10	1	11	—
Lärkfalk (*Falco subbuteo*)	3	—	3	—
Stenfalk (*Falco columbarius*)	8	1	9	—
Tornfalk (*Falco tinnunculus*)	15	1	16	—
Fjällvråk (*Buteo lagopus*)	3	—	3	—
Duvhök (*Accipiter gentilis*)	1	—	1	—
Sparvhök (*Accipiter nisus*)	223	36	259	37
Gravand (*Tadorna tadorna*)	188	17	205	7
Gräsand (*Anas platyrhynchos*)	173	4	177	13
Kricka (*Anas crecca*)	36	—	36	8
Årta (*Anas querquedula*)	6	—	6	1
Stjärtand (*Anas acuta*)	57	—	57	7
Skedand (*Anas clypeata*)	41	1	42	1
Bergand (*Aythya marila*)	28	—	28	—
Ejder (*Somateria mollissima*)	339	18	357	33
Svärta (*Melanitta fusca*)	96	5	101	6
Storlom (*Colymbus arcticus*)	1	—	1	—
Ringduva (*Columba palumbus*)	11	2	13	—
Skogsduva (*Columba oenas*)	2	—	2	—
Myrspov (*Limosa lapponica*)	96	2	98	4
Storspov (*Numenius arquata*)	22	—	22	1
Småspov (*Numenius phaeopus*)	1	—	1	—
Morkulla (*Scolopax rusticola*)	2	—	2	—
Enkelbeckasin (*Capella gallinago*)	38	9	47	4
Dvärgbeckasin (*Lymnocryptes minimus*)	6	—	6	—
Smalnäbbad simsnäppa (*Phalaropus lobatus*)	2	—	2	—
Roskarl (*Arenaria interpres*)	384	8	392	15
Kustsnäppa (*Calidris canutus*)	589	1	590	15

Tabell 3 forts.

Art (*Species*)	Antal märkta t. o. m. 1954 (*Number ringed up to 1954*)	Märkta 1955 (*Ringed 1955*)	Total-summa (*Total sum*)	Återfynd (*Recoveries*)
Kärrsnäppa (*Calidris alpina*)	18.900	445	19.345	311
Spovsnäppa (*Calidris ferruginea*)	1.104	3	1.107	15
Småsnäppa (*Calidris minuta*	450	—	450	5
Mosnäppa (*Calidris temminckii*)	218	5	223	9
Skärsnäppa (*Calidris maritima*)	1	—	1	—
Sandlöpare (*Calidris alba*)	9	—	9	—
Brushane (*Philomachus pugnax*)	1.081	103	1.184	25
Myrsnäppa (*Limicola falcinellus*)	107	3	110	1
Tereksnäppa (*Xenus cinereus*)	1	—	1	—
Drillsnäppa (*Tringa hypoleucos*)	609	139	748	15
Grönbena (*Tringa glareola*)	3.170	602	3.772	69
Skogssnäppa (*Tringa ochropus*)	19	3	22	—
Rödbena (*Tringa totanus*)	1.459	307	1.766	53
Svartsnäppa (*Tringa erythropus*)	26	5	31	3
Gluttsnäppa (*Tringa nebularia*)	2	—	2	—
Större strandpipare (*Charadrius hiaticula*)	1.121	64	1.185	27
Mindre strandpipare (*Charadrius dubius*)	6	1	7	—
Ljungpipare (*Pluvialis apricaria*)	1	—	1	—
Kustpipare (*Pluvialis squatarola*)	5	—	5	—
Tofsvipa (*Vanellus vanellus*)	264	29	293	7
Skärfläcka (*Recurvirostra avosetta*)	20	2	22	1
Strandskata (*Haematopus ostralegus*)	239	28	267	6
Trana (*Grus grus*)	1	—	1	—
Fisktärna (*Sterna hirundo*)	62	12	74	3
Silvertärna (*Sterna paradisaea*)	105	3	108	8
Småtärna (*Sterna albifrons*)	—	1	1	—
Skrattmås (*Larus ridibundus*)	361	62	423	25
Fiskmås (*Larus canus*)	551	9	560	8
Gråtrut (*Larus argentatus*)	6	—	6	—
Silltrut (*Larus fuscus*)	11	2	13	—
Havstrut (*Larus marinus*)	11	1	12	1
Sillgrissla (*Uria aalge*)	1	—	1	—
Kornknarr (*Crex crex*)	1	—	1	—
Småfläckig sumphöna (*Porzana porzana*)	3	—	3	—
Vattenrall (*Rallus aquaticus*)	15	—	15	—
Rörhöna (*Gallinula chloropus*)	2	—	2	—
Rapphöna (*Perdix perdix*)	143	18	161	15
Summa 160 arter	89.592	9.522	99.114	1.370

Återfynd

Under tiden 1.2.55—31.1.56 inrapporterades 155 nya återfynd, varmed totalsumman uppgår till 1.370 (= 1,4 %). Jämfört med åren 1953—54 är antalet lågt, vilket sammanhänger med att kontroller av kärrsnäppor praktiskt taget uteblev samt att inga kontroller utfördes i hussvalekolonien på Ottenby gård.

Ovanligt många arter är representerade i återfyndstabellen, och fem återfinns där för första gången: grönfink, ortolansparv, göktyta, svartsnäppa och havstrut. Av svartsnäppa föreligger t. o. m. tre fynd, samtliga från Italien. Dessa är mycket värdefulla, enär återfynd av denna art varit synnerligen efterlängtade. Även göktytan anträffades i Italien, liksom bl. a. en sävsparv, en sävsångare, en härmsångare, en trädgårdssångare och en törnsångare. Detta gör att man med största intresse emotser resultaten av SOF:s verksamhet vid Capri fågelstation. En svartsnäppa och en spovsnäppa anträffades rentav inom synhåll från Capristationen!

Det första fyndet av ortolansparv gjordes i Vasa län i Finland en vecka efter märkningen, som ägde rum i slutet av maj. Ytterligare ett intressant resultat av märkningarna under vårsträcket föreligger i det att en törnsångare, som fångades den 26.5., påträffades död S om Oslo den 7.7. Stationens tredje svarthätta rapporterades från Beirut (Libanon) i slutet av juni. Egendomligt nog gjordes det närmast föregående fyndet också vid Beirut och vid samma årstid.

Två starar, som märkts tillsammans i slutet av oktober, hade i slutet av januari icke kommit längre än till Jylland.

I rapporten över 1954 års verksamhet vid Ottenby omnämndes ett fynd av grå flugsnappare från Belgiska Kongo (VF 14: 217). Ytterligare ett återfynd av denna art och på praktiskt taget samma plats gjordes 1955. Det är därför särskilt glädjande, att ringmärkningsverksamhet nyligen startats i Belgiska Kongo (f. ö. med ringar från SOF:s ringleverantör, firma I. Ö. Mekaniska i Bankeryd).

Det område, inom vilket Ottenby-märkta kärrsnäppor anträffats, vidgades i flera riktningar: åt NE (Archangelsk 19.5.53.), åt W (NW Irland) och åt SE (Grekland — två fynd). Endast två egna kontroller på kärrsnäppor gjordes vid Ottenby, varav den ena den 27.5. i samband med den tidigare nämnda enorma koncentrationen av kärrsnäppor vid månadsskiftet maj/juni. Vid ungefär samma tid (3.6.) kontrollerades ett exemplar som märkts vid Revtangen (Norge) den 1.10.52. Ett annat, som försetts med ring på Amager (Danmark)

Fig. 3. Nötkråkor visade sig även hösten 1955. De tillhörde den tjocknäbbade formen. Foto: Boris Engström. (*Several Nucifraga c. caryocatactes could be seen at Ottenby in 1955.*)

den 28.7.54, återfanns vid Ottenby i juli 1955. En kustsnäppa, som 1953 sträckte förbi Ölands södra udde, valde 1955 vägen utefter Norges kust och påträffades SE om Bergen i slutet av augusti.

För grönbena redovisas icke mindre än 19 återfynd, varav 9 från Norditalien och 6 från Camargue (Rhônedeltat). Samtliga dessa 15 anträffades under augusti och september — var de grönbenor som passerar Ottenby tillbringar vintern är ännu så länge okänt, ty under tiden 5.10—19.2. har ännu ingen av våra grönbenor påträffats. Det är möjligt att det egentliga vinterkvarteret ligger i Afrika. En grönbena, som märktes på genomflyttning den 13.8.55 vid STATION BIOLOGIQUE DE LA TOUR DU VALAT i Camargue, där redan två Ottenbymärkta grönbenor kontrollerats (9.9.54 och 6.8.55), återfanns nämligen den 30.12.55 nära Dakar (Västafrika). Camargue synes överhuvudtaget vara en viktig mellanlandningsplats på Ottenbyvadarnas flyttningsväg mot söder. Under året har därifrån ytterligare inrapporterats bl. a. en småsnäppa, en drillsnäppa och en större strandpipare. I detta sammanhang kan nämnas att en kricka, som sköts ca 5 km NNE om fågelstationen den 21.10.55, hade ringmärkts i Camargue den 25.11.54.

En skrattmås med ringen UO 615 hittades död i Sandvik strax NE om stationen den 10.10. Det befanns egendomligt nog att den redan en gång tidigare förekommit i en Ottenbyrapport (VF 12: 164). Den hade nämligen kontrollerats i kikare i Genève i januari 1952 och var märkt som häckfågel vid Ottenby den 30.6.49.

Sparvhöken är en art som av naturliga skäl har hög återfyndsprocent. Under året har 8 nya fynd tillkommit, därav en från en plats NE om Ladoga. Två rapporterades från Skåne med tydlig kurs mot Falsterbo. Den ena stupade så nära vår andra fågelstation som vid Trelleborg. Säkerligen har många sträckande sparvhökar registrerats av SOF-observatörer både vid Ottenby och Falsterbo, innan de definitivt lämnat Sverige för säsongen.

Nya återfynd

(*New recoveries*)

Denna tabell har sammanställts av BENGT DANIELSSON, för vilken hjälp förf. är mycket tacksam.

h: med visshet häckande eller kläckt vid Ottenby. (*Breeding or hatched at Ottenby.*)
g: genomflyttare, härkomst okänd. (*Passage migrant.*)
Ringnummer i *kursiv* stil anger, att ringen insänts tillsammans med rapporten.
(*Ring numbers in italics mean that the ring has been returned together with the information on the recovery.*)

Stare (*Sturnus vulgaris*)

YO	*6077*	20.7.51. juv.	g.	— anträffad North Walsham, Norfolk, England, 12.2.55.
YO	*6160*	22.7.51. juv.	g.	— funnen död, Ballymena, Antrim, N. Irland, 15.3.55.
YE	654	25.10.52. ad.	g.	— funnen död, Alnwick, Northumberland, England, 19.3.54.
	505917	14.7.54.	g.	— funnen död, St. Anthony-in-Roseland, Cornwall, England, (50° 10′ N, 5° 00′ W), slutet av febr. 55.
	514916	19.10.54.	g.	— skjuten, Helsby, Cheshire, England, 7.3.55.
	515200	30.10.54.	g.	— funnen död, Jordrup, (25 km W Fredericia), Jylland, Danmark, 22.1.55.
	515209	30.10.54.	g.	— funnen död, Guldager, (6 km NNW Esbjerg), Jylland, Danmark, 25.1.55.
	509639	3.5.55. ad.	g.	— kontrollerad, Öl. Segerstad, Öland, 20 km NNE, 18.5.55, häckande.
	511074	10.8.55. juv.	g.	— fångad, Maldegem, Östflandern, Belgien, okt. 55.

Grönfink (*Chloris chloris*)

	515420	31.10.54. ad. ♂	g.	— kontrollerad, Badkowo, nära Pioty, Szczecin, Polen, 15.3.55.

Grönsiska (*Carduelis spinus*)

ZAT	*3216*	25.9.53. ad. ♂	g.	— funnen död, vid Langensalza, Thüringen, Tyskland, 6.3.55.

Hämpling (*Carduelis cannabina*)

	103678	22.6.54. ad. ♀	h?	— kontrollerad, Ottenby, 28.7.55.

Bofink (*Fringilla coelebs*)

S	*13153*	21.9.53. ad. ♂	g.	— funnen död, Dendermonde, Östflandern, Belgien, jan. 55.

Gulsparv (*Emberiza citrinella*)

S	*14122*	3.10.53.	g.	— funnen död, Långlöt, Öland, 62 km NNE, 19.7.55.

Ortolansparv (*Emberiza hortulana*)

	202742	25.5.55. ad. ♀	g.	— funnen död, Evijärvi, Vasa län, Finland, 2.6.55.

Sävsparv (*Emberiza schoeniclus*)

	109823	17.10.55.	g.	— dödad, nära Brescia, Lombardia, Italien, 12.11.55.

Sånglärka (*Alauda arvensis*)

	201852	4.8.54.	g.	— kontrollerad, Ottenby, 9.9.55.

Grå flugsnappare (*Muscicapa striata*)

	202509	26.8.54.	g.	— anträffad, Kihukutu, Kwango (lat. 6° S), Leopoldville, Belgiska Kongo, Afrika, 8.4.55.

Svartvit flugsnappare (*Muscicapa hypoleuca*)

202064 17.8.54. g. — funnen död, Enskede, Stockholm, (360 km NNE), 1.7.55.

Sävsångare (*Acrocephalus schoenobaenus*)

107473 16.8.55. g. — dödad, nära Vicenza, Veneto, Italien, 25.8.55.

Härmsångare (*Hippolais icterina*)

107668 20.8.55. g. — dödad, Reggio, Calabria, Italien, 11.9.55.

Trädgårdssångare (*Sylvia borin*)

108509 8.9.55. g. — dödad, nära Brescia, Lombardia, Italien, 25.9.55.

Svarthätta (*Sylvia atricapilla*)

H *191176* 1.6.53. ad. ♂ g. — skjuten, nära Beirut, Libanon, omkr. 28.6.55.

Törnsångare (*Sylvia communis*)

100064 8.8.52. g. — funnen i masken på en bil, mellan Västerås och Köping, Västmanland, ca 375 km N, 27.7.55.

106248 26.5.55. g. — skjuten, Clusone, Lombardia, Italien, 3.9.55.

106281 26.5.55. g. — funnen död, mellan Horten och Holmestrand, Vestfold, Norge, 7.7.55.

Taltrast (*Turdus ericetorum*)

505156 21.9.53. juv. g. — anträffad, 18 km SE Bordeaux, Gironde, Frankrike, mars 55.

514921 20.10.54. g. — funnen död, S:t Aulaye, 56 km V Périgueux, Dordogne, Frankrike, 23.2.55.

Rödvingetrast (*Turdus musicus*)

514837 16.10.54. g. — dödad, 16 km E Florens, Toscana, Italien, 22.2.55.

511907 10.10.55. g. — dödad, nära Taranto, Puglia, Italien, 14.12.55.

Rödhake (*Erithacus rubecula*)

104787 4.10.54. g. — fångad, Beas de Segura, Jaén, Spanien, 18.12.54.

104885 7.10.54. g. — fångad, Santa Margarita, Mallorca, Spanien, jan. 55.

105139 16.10.54. g. — skjuten, La Garde, Var, Frankrike, 2.2.55.

102699 17.4.55. ad. g. — fångad, Pozoblanco, Córdoba, Spanien, enl. tidningsnotis den 30.10.55.

103116 28.4.55. ad. g. — dödad, nära Trento, Veneto, Italien, 3.11.55.

109247 5.10.55. g. — funnen död, S. Antioco, SW Sardinien, Italien, 15.12.55.

Hussvala (*Delichon urbica*)

103854 8.7.54. pull. h. — funnen död, Kalmar slott, Småland, 50 km N, 28.7.55.



Fig. 4. Över 12.000 rödhakar har hittills ringmärkts vid Ottenby fågelstation. Foto: Boris Engström. (*Over 12.000 Erithacus rubecula have been ringed at Ottenby.*)

Göktyta (*Jynx torquilla*)

ZOE	*4254*	29.4.52.		g. — dödad, nära Reggio, Calabria, Italien, 6.9.54.

Hornuggla (*Asio otus*)

UO	1188	9.8.53.		g. — skjuten, 35 km SW Amiens, Somme, Frankrike, 11.11.54.
	830001	17.10.54.		g. — funnen i stark förruttnelse, Saksköbing, Lolland, Danmark, april 55.

Sparvhök (*Accipiter nisus*)

UO	889	14.8.50.	juv. ♀	g. — fångad, nära Namur, prov. Namur, Belgien, 15.10.54.
UO	894	28.8.50.	juv. ♀	g. — anträffad, Olonets (61° N, 33° E), Karelsk-Finska republiken, Sovjetunionen, 16.11.53.
UO	895	31.8.50.	juv. ♀	g. — fångad, Cuneo, Piemonte, Italien, 29.11.54.
XO	*255*	21.8.51.	juv.	g. — funnen död under kraftledn., Heudeber, Sachsen-Anhalt, Tyskland, 26.2.55.
	800043	28.8.54.	juv. ♀	g. — skjuten, Hüls/Krefeld, Westfalen, Tyskland, 22.2.55.
	800078	26.9.54.	juv. ♀	g. — fångad, nära Antwerpen, Belgien, 10.3.55.
	800195	4.9.55.	ad. ♀	g. — skjuten, strax E Trelleborg, Skåne, 222 km SW, 19.9.55.
	800196	5.9.55.	ad. ♀	g. — funnen död, Skepparslöv, Skåne, 145 km WSW, 3.10.55.
X	22013	20.9.53.	juv.	g. — död. mot fönster, Treuenbrietzen, 60 km SW Berlin, Tyskland, 20.11.53. (Meddelad i föregående rapport, där dock återfyndsdatum bortfallit.)

Gravand (*Tadorna tadorna*)

	830015	11.7.55.	pull.	h. — funnen död, Ribe, Jylland, Danmark, 16.10.55.

Ejder (*Somateria mollissima*)

SO	*69*	28.6.50.	ad. ♀	h? — funnen död, Ottenby, 19.6.54.
SO	*129*	26.7.51.	pull.	h. — skjuten, (♂), vid Marstrand, Bohuslän, 345 km NW, 6.1.55.
SO	*172*	16.7.54.	pull.	h. — skjuten, Vejle fjord, Jylland, Danmark, 6.11.54.

Myrspov (*Limosa lapponica*)

XO	*266*	23.9.51.	ad.	g. — skjuten, Öland i Limfjorden, Jylland, Danmark, 20.8.55.

Roskarl (*Arenaria interpres*)

YO	*7250*	21.7.52.	ad.	g. — fångad, Ile de Ré, Char.-Mar., Frankrike, 21.5.53. el. 54.
	500649	18.8.52.	juv.	g. — skjuten, 20 km W Saint Nazaire, Loire Inf., Frankrike, 20.5.55.
	503396	23.7.53.	ad. ♂	g. — dödad, St. Georges de Didonne, Char.-Mar., Frankrike, 7.5.54.

Kustsnäppa (*Calidris canutus*)

YO	1611	27.8.48.	ad.	g. — anträffad, Mimizan-les-Bains, Landes, Frankrike, 23.5.54.
	504445	30.8.53.	ad.	g. — funnen skadad och dödad, 45 km SE Bergen, Hordaland, Norge, 28.8.55.

Kärrsnäppa (*Calidris alpina*)

ZO	7268	12.7.48. ad.	g. — anträffad, Archangelsk, Sovjetunionen, 19.5.53.
ZO	*9865*	4.9.48.	g. — fångad, 32 km NE Arles, Bouches-du-Rhône, Frankrike, 28.12.53.
ZOA	6670	3.8.49. ad.	g. — anträffad, Bassin, d'Arcachon, Gironde, Frankrike, 9.5.54.
ZOA	*8399*	15.8.49. ad.	g. — endast tarsben med ring påträffat, Rock, Cornwall, England, (50° 34′ N, 4° 56′ W), 17.8.55.
ZOB	9210	26.7.50. ad.	g. — anträffad, Merdja Daoura, N Port-Lyautey, Marocko, (34° 40′ N, 6° 22′ W), 13.1.55.
ZOD	*8082*	22.7.51. ad.	g. — skjuten, Ordrup, Odsherred, NW Själland, Danmark, 20.11.54.
ZV	7638	20.7.52. ad.	g. — fångad, 38 km SW Saintes, Char.-Mar., Frankrike, 2.2.54.
ZV	7685	21.7.52. ad.	g. — kontrollerad, Ottenby, 27.5.55.
YO	*7330*	22.7.52. ad.	g. — funnen död, Friedrichskoog, Schlesw.-Holst. Tyskland, 22.4.55.
	500070	15.8.52. juv.	g. — dödad, nära Pénerf, Morbihan, Frankrike, 4.3.55.
	101006	7.7.53. ad.	g. — skjuten, Ballysadare Bay, Sligo, Eire, (54° 13′ N—8° 31′ W), 6.2.55.
	502313	17.7.53. ad.	g. — kontrollerad, Ottenby, 24.7.55.
	502577	19.7.53. juv.	g. — dödad, St Valéry-sur-Somme, Somme, Frankrike, 10.1.55.
	502954	20.7.53. ad.	g. — anträffad, Xánthe, Trakien, Grekland, 2.3.54.
G	54312	31.7.53. ad.	g. — skjuten, Bassin d'Arcachon, Gironde, Frankrike, 2.2.55.
	503900	15.8.53. ad.	g. — funnen död, Morecambe, Lancashire, England, ca 29.12.55.
	504791	2.9.53. juv.	g. — funnen död, Burano nära Venedig, Veneto, Italien, 7.11.55.
	506638	22.7.54. ad.	g. — skjuten, St-Xandre nära La Rochelle, Char.-Mar., Frankrike, 19.11.54.
	506646	22.7.54. ad.	g. — skjuten, Redon, 64 km SW Rennes, Ille-et-Vilaine, Frankrike, 1.1.55. — Även tars insänd.
	506680	22.7.54. ad.	g. — skjuten, Marano Lagunare, Veneto, Italien, 10.2.55. — Även tars insänd.
	506966	27.7.54. ad.	g. — skjuten, Bradwell, Essex, England, (51° 44′ N, 0° 54′ E), 9.12.55.
	507141	28.7.54. ad.	g. — anträffad, Khalkìs, Eubea, Grekland, 31.10.54.
	507465	30.7.54. ad.	g. — skjuten, Bone, Constantine, Algeriet, 26.10.54.
	507774	1.8.54. ad.	g. — skjuten, Viana do Castelo, Minho, Portugal, jan. 55.
	508367	5.8.54. ad.	g. — dödad, nära Le Havre, Seine-Mar., Frankrike, 20.3.55.
	508672	9.8.54. ad.	g. — dödad, nära Rovigo, Veneto, Italien, 16.12.55.
	508764	10.8.54. juv.	g. — skjuten, Surville nära Carteret, Manche, Frankrike, 18.1.55.
	509043	11.8.54. juv.	g. — dödad, 27 km SW Rochefort, Char.-Mar., Frankrike, 17.10.54.

	513734	5.9.54. juv.	g.	— dödad, Arès, 45 km SW Bordeaux, Gironde, Frankrike, 11.12.54.
	513742	5.9.54. juv.	g.	— skjuten, St Trojan-les-Bains, Île d'Oléron, Char.-Mar., Frankrike, 12.10.54.
	513869	6.9.54. juv.	g.	— skjuten, Riva-Bella, 15 km NE Caen, Calvados, Frankrike, 6.11.54.
	514028	8.9.54. juv.	g.	— skjuten, Bassin d'Arcachon, Gironde, Frankrike, 13.3.55.
	514172	11.9.54. juv.	g.	— skjuten, Batz-sur-Mer, Loire Inf., Frankrike, 23.1.55.
	514240	13.9.54. juv.	g.	— skjuten, Winteringham, Humber, Lincolnshire, England, (53° 42′ N, 0° 34′ W), 5.1.56.
	514612	26.9.54. juv.	g.	— skjuten, Scheldes mynning, 30 km NW Antwerpen, Zeeland, Holland, 14.1.55.
	514666	29.9.54. juv.	g.	— funnen döende, Boltenhagen, Mecklenburg, Tyskland, (53° 59′ N, 11° 14′ E), 15.1.55.
	203030	24.8.55. juv.	g.	— skjuten, nära Aveiro, Beira Litoral, Portugal, c:a 20.12.55.
		Spovsnäppa (*Calidris ferruginea*)		
YO	7452	22.7.52. ad.	g.	— fångad, St Vivien, Medoc, Gironde, Frankrike, 16.8.54.
	503077	21.7.53. ad.	g.	— funnen död, nära Salerno, Campania, Italien, 12.5.55.
		Småsnäppa (*Calidris minuta*)		
K	*26963*	12.9.53. juv.	g.	— dödad, Salin de Giraud, Camargue, Bouches-du-Rhône, Frankrike, dec. 54. — Även tars insänd.
		Mosnäppa (*Calidris temminckii*)		
	101324	5.8.53. ad.	g.	— fångad, sammanflödet av Po och Oglio, Veneto, Italien, 21.8.55.
	201898	6.8.54. ad.	g.	— dödad, nära Ravenna, Emilia, Italien, 26.3.55.
		Brushane (*Philomachus pugnax*)		
XO	477	14.7.53. juv. ♂	g.	— skjuten, nära Lestizza, Udine, Italien, 27.2.55.
G	*54579*	4.8.53. juv. ♀	g.	— skjuten, nära Ancona, Marche, Italien, 18.3.55.
	700893	30.8.55. juv. ♂	g.	— dödad, St-Vigor, 30 km E Le Havre, Seine Inf., Frankrike, 22.9.55.
		Drillsnäppa (*Tringa hypoleucos*)		
	502126	17.7.53. ad.	g.	— kontrollerad, Ottenby, 5.7.55.
	510670	3.8.55. juv.	g.	— fångad, Istres, Bouches-du-Rhône, Frankrike, 14.8.55.
	203115	29.8.55. juv.	g.	— dödad, Bouglon, 17 km SSW Marmande, Lot-et-Garonne, Frankrike, 15.9.55.
		Grönbena (*Tringa glareola*)		
	506928	26.7.54. juv.	g.	— kontrollerad, Camargue, Bouches-du-Rhône, Frankrike, 6.8.55.
	507531	30.7.54. juv.	g.	— funnen under kraftledn., Kusmark, 22 km NW Skellefteå, Västerbotten, 1000 km NNE, ca 25.5.55.



Fig. 5. Ringautomat vid Ottenby fågelstation. Foto: Boris Engström.

507995	3.8.54.	juv.	g. — dödad, nära Ferrara, Emilia, Italien, 1.9.54.
509131	13.8.54.	juv.	g. — dödad, nära Florens, Toscana, Italien, 1.9.54.
509252	16.8.54.	juv.	g. — dödad, nära Bari, Puglia, Italien, 17.9.54.
509545	24.8.54.	juv.	g. — skjuten, nära Vercelli, Piemonte, Italien, sept. 54.
514361	16.9.54.	juv.	g. — anträffad, Krakowitz, Polen, (51° 55′ N, 23° 10′ E), 26.9.54.
510587	30.7.55.	juv.	g. — anträffad, Camargue, Bouches-du-Rhône, Frankrike, 21.8.55. — Även tars insänd.
510700	3.8.55.	juv.	g. — skjuten, nära Cambrai, Nord, Frankrike, 22.8.55.
510854	7.8.55.	juv.	g. — skjuten, Vauvert, Gard, Frankrike, ca 29.8.55. — Även tars insänd.
510914	9.8.55.	juv.	g. — dödad, nära Aiguesmortes, Gard, Frankrike, 18.9.55.

	510972	9.8.55. juv.	g.	— dödad, nära Modena, Emilia, Italien, 23.8.55.
	511059	10.8.55. juv.	g.	— dödad, 7 km S St Gilles, Gard, Frankrike, 22.9.55. — Även tars insänd.
	511091	10.8.55. juv.	g.	— dödad, nära Pavia, Lombardia, Italien, 10.9.55.
	511309	13.8.55. juv.	g.	— dödad, nära Venedig, Veneto, Italien, 8.9.55.
	511617	24.8.55. juv.	g.	— skjuten, nära Arles, Bouches-du-Rhône, Frankrike, 21.9.55.
	511618	24.8.55. juv.	g.	— dödad, nära Milano, Lombardia, Italien, 20.9.55.
	511669	25.8.55. juv.	g.	— dödad, nära Bologna, Emilia, Italien, 10.9.55.
	511672	25.8.55. juv.	g.	— skjuten, Argenta, 40 km SE Ferrara, Emilia, Italien, 18.9.55.

Rödbena (*Tringa totanus*)

	501779	12.7.53. juv.	h?	— kontrollerad, Ottenby, 8.6.55.
	501833	13.7.53. juv.	g.	— dödad, 15 km NE Caen, Calvados, Frankrike, 14.7.55.
	700199	19.7.54. juv.	g.	— funnen död, mynningen av Authie, Somme, Frankrike, 8.8.54.
	700273	1.8.54. juv.	g.	— skjuten, Etang de Lapalme, Aude, Frankrike, 10.10.54.
	700519	19.6.55. pull.	h.	— skjuten, Bassin d'Arcachon, Gironde, Frankrike, 23.8.55.
	700664	23.7.55. juv.	g.	— anträffad, halvön Quiberon, Morbihan, Frankrike, 5.8.55.
	700685	26.7.55. juv.	g.	— dödad, Île d'Oléron, Char.-Mar., Frankrike, 17.8.55.
	700709	29.7.55. juv.	g.	— skjuten, Mira, Beira Litoral, Portugal, 6.9.55.
	700802	9.8.55. juv.	g.	— skjuten, Gruissan, Aude, Frankrike, 21.8.55.

Svartsnäppa (*Tringa erythropus*)

G	*54573*	4.8.53. ad.	g.	— skjuten, nära Arezzo, Toscana, Italien, 12.4.55.
G	*54686*	8.8.53. juv.	g.	— dödad, nära Cagliari, Sardinien, Italien, 16.10.55.
	700812	9.8.55. juv.	g.	— dödad, nära Neapel, Campania, Italien, 4.9.55.

Större strandpipare (*Charadrius hiaticula*)

ZAX	4422	1.8.53. juv.	g.	— dödad, Sidi-Ben-Nour, 70 km S Mazagan, Marocko, 16.1.55.
ZAX	5002	16.8.53. juv.	g.	— skjuten, Île d'Oléron, Char.-Mar., Frankrike, 28.5.55.
	508078	3.8.54. ad.	g.	— skjuten, Bassin d'Arcachon, Gironde, Frankrike, 1.5.55. — Även tars insänd.
	508511	7.8.54. juv.	g.	— skjuten, 16 km N Lesparre-Medoc, Gironde, Frankrike, 20.10.54.
	513768	5.9.54. juv.	g.	— dödad, nära St Nazaire, Loire Inf., Frankrike, 29.9.54.
	513877	6.9.54. juv.	g.	— skjuten, Beauduc, Camargue, Bouches-du-Rhône, Frankrike, 15.9.55. — Även tars insänd.

Tofsvipa (*Vanellus vanellus*)

XO	448	31.5.53. pull.	h. —	funnen död, Ottenby, 12.6.55.

Strandskata (*Haematopus ostralegus*)

UO	*1053*	16.6.52. juv.	h? —	funnen död, Ottenby, 10.6.55.
UO	*1154*	16.7.53. juv.	h? —	kontrollerad, Ottenby, 15.7.55.

Silvertärna (*Sterna paradisaea*)

YO	*5521*	9.6.51. ad.	h. —	kontrollerad, Ottenby, 7.6.53; funnen död, ca 70 sjömil ENE Hammerens fyr, Bornholm, Danmark, 6.6.55.

Skrattmås (*Larus ridibundus*)

UO	*360*	11.7.47. juv.	g? —	funnen död, Husum, Schlesw.-Holst., Tyskland, början av okt. 55.
UO	579	25.6.49. ad.	h. —	skjuten, Sånga sn, Uppland, 360 km NNE, 24.6.55.
UO	*615*	30.6.49. ad.	h. —	kontrollerad, Genève, Schweiz, 20 o. 31.1.52, funnen död, Ottenby, 2 km NE, 10.10.55;
XO	472	8.7.53. ad.	h? —	funnen död, nära Leerdam, Zuid-Holland. Holland, 24.7.55.
	800006	21.6.54.	h? —	funnen död, Grimsby, Lincolnshire, England, 14.9.55. — Även tars insänd.
	800039	15.8.54. juv.	g. —	funnen död, Bremen, Tyskland, 20.5.55.
	800175	22.8.55. juv.	g. —	rester anträffade, nära Åhus, Skåne, 135 km WSW, 6.10.55.

Havstrut (*Larus marinus*)

SO	*170*	6.7.54. pull.	h. —	skjuten, Bröndby strand, Köge Bugt, Själland, Danmark, 25.11.54.

Summary: **The activities of the Ottenby Bird Station in 1955. (Ottenby Bird Station Report No. 21.)**

The station was manned from the beginning of April to the end of October. Spring migration was late this year, and several cases of reversed migration were noted following irruptions of cold air from the north. A conspicuous case has been commented upon earlier in this journal (VF 15, p. 54).

As in previous years, continuous observations of the birds flying past the south point of Öland in daylight were performed from 1 June to 31 October. The irruption of *Garrulus glandarius* was followed in detail. Mostly the birds approached the point flying at great height and proceeded out over the sea while still ascending, whereupon they suddenly fell steeply down to the lighthouse garden and after a short rest headed north for the Ottenby forest, to try it all again on a later occasion. Only 100 individuals were seen leaving the island for good.

A striking feature of the autumn migration was the almost total absence of small waders of the genus *Calidris*, especially *Calidris alpina*, which in the last eight years have been seen and trapped in such great numbers at the Bird Station. According to H. Holgersen, of the Revtangen Station, no corresponding reduction in the number of dunlins was noted in southern Norway.

In addition to the observations carried out at Ottenby, observations were also made of the great passage of sea-birds which takes place in Kalmar Sound, between

Öland and the Swedish mainland, and which has not earlier been subjected to regular studies for any longer periods. Table 1 gives the number of sea-birds seen on passage through the Kalmar Sound, at Revsudden point, during the period 5—24 October 1955. The total number seen amounted to 72.000, of which *i. a.* 56.000 *Somateria mollissima* and 1.500 *Branta bernicla.*

As usual, considerable weather-movements of swifts took place in June and July: on each of the three days 3, 4, and 16 July, more than 10.000 flew south past the station. The »zwischenzug» of young starlings reached its peak on 6 July with nearly 17.000 individuals counted on passage. Among rare southern and eastern birds seen at Ottenby during the year were some *Streptopelia turtur*, a *S. decaocto* (28 June), a *Dendrocopos medius* (2 Oct.) and a *Circus macrourus* (a female repeatedly seen during the summer).

A total of 9.522 birds were ringed at Ottenby during the year, and 155 were recovered in Sweden or abroad: three *Tringa erythropus* from Italy, 19 *Tringa glareola* (mostly from N. Italy and the Camargue), a *Calidris canutus* from Norway (change of route!), etc. An interesting recovery is that of an adult male *Sylvia atricapilla* from Beirut, Libanon, about 28 June. This is the second Ottenby blackcap from Libanon in that time of the year, which throws an interesting light on the note on late blackcaps in the Near East (Palestine) by Colonel MEINERTZHAGEN in a recent issue of The Ibis (vol. 96, p. 293, 1954).